

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 28/2019

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

I. NHÃN HỘP TRUNG GIAN (Hộp 40 vỉ)

R _x Thuốc bán theo đơn	Hộp 40 Vỉ x 8 Viên ngậm
TYROTHRICIN PASTILLE	
Tyrothricin 1mg	GMP-WHO
CHỈ ĐỊNH: Điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn niêm mạc vùng miệng, họng như viêm họng, amidan cấp tính, viêm miệng, viêm lợi.	
CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.	
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM - Sản xuất theo TCCS. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.	SĐK: Số lô SX: Ngày SX: HD :
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam	



II. NHÃN HỘP TRUNG GIAN (Hộp 120 vỉ)

R _x Thuốc bán theo đơn	Hộp 120 Vỉ x 8 Viên ngậm
TYROTHRICIN PASTILLE	
Tyrothricin 1mg	GMP-WHO
CHỈ ĐỊNH: Điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn niêm mạc vùng miệng, họng như viêm họng, amidan cấp tính, viêm miệng, viêm lợi.	
CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.	
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM - Sản xuất theo TCCS. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. Thuốc dùng trong bệnh viện.	SĐK: Số lô SX: Ngày SX: HD :
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam	



II. NHÃN VỈ

(Số lô SX, Hạn dùng in nổi trên vỉ)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

R_x

TYROTHRICIN PASTILLE

Viên ngậm

CÔNG THỨC:

- Tyrothricin 1 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên

(Menthol, Glucose monohydrate, Đường trắng, Aspartame, Povidone, Magnesium stearate)

DƯỢC LỰC HỌC:

- Tyrothricin là kháng sinh thuộc nhóm polypeptide, có tác dụng hiệu quả trên cầu khuẩn, trực khuẩn gram (+) và một số cầu khuẩn gram (-).

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Tyrothricin có tác động kháng khuẩn tại chỗ.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn niêm mạc vùng miệng, họng như viêm họng, amidan cấp tính, viêm miệng, viêm lợi.

CÁCH DÙNG:

- Ngậm viên thuốc cho tan từ từ trong miệng. Không nên nhai hay nuốt.
- Liều dùng: theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
- Liều đề nghị: Ngậm 4-10 viên/ngày, cách khoảng 1 giờ giữa các lần ngậm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 3 tuổi.

THẬN TRỌNG:

- Bệnh nhân bị tiểu đường vì viên ngậm có chứa glucose và đường trắng.
- Điều trị không nên kéo dài quá 10 ngày.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: độ an toàn của viên ngậm chứa Tyrothricin chưa được xác định ở phụ nữ mang thai. Thận trọng khi dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai.
- Thời kỳ cho con bú: không cho con bú khi dùng thuốc này.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Chưa thấy Tyrothricin gây ra tác dụng phụ ở liều điều trị.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa thấy có tương tác giữa Tyrothricin với các thuốc khác.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ $\leq 30^{\circ}\text{C}$, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

- Hộp 40 vi x 8 viên ngậm.
- Hộp 120 vi x 8 viên ngậm.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt – Q11 – TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 03 năm 2014

Giám Đốc Chất Lượng Cơ Sở Đăng Ký & Sản Xuất Thuốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



DS. *Nguyễn Thùy Vân*

