

MẪU HỘP NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

586/157



MẪU HỘP :

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 1 / 1 / 15

Công thức:
Acid Ascorbic.....1000mg
Tá dược vô.....1 viên
Chỉ định: Điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin C

Chống chỉ định:
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Rx Thuốc bán theo đơn

UP-MISA

VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C 1000 mg



Tuỳ 10 viên sắc bột



Cách Dùng và Liều Dùng:

Chỉ dùng cho người lớn, 1 viên/ngày.
Dùng đường uống - hoà tan viên thuốc vào nửa cốc nước.
Tiêu chuẩn: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK :

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

4A - Lô Lu - P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp HCM - ĐT: 08.37300167 - Fax: 08.37301103
Email: info@qmmediphar.com - Website: www.QMmediphar.com

Rx Thuốc bán theo đơn

UP-MISA

VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C 1000 mg



Tuỳ 10 viên sắc bột



MẪU NHÃN :

Rx Thuốc bán theo đơn

UP-MISA C

VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C VITAMIN C 1000 mg



Tuỳ 10 viên sắc bột



Công thức:

Acid Ascorbic.....1000mg
Tá dược vô.....1 viên

Số lô SX:

Chỉ định:

Điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin C.

NSX:

HĐ:

Cách Dùng và Liều Dùng:

Chỉ dùng cho người lớn 1 viên/ngày.
Dùng đường uống - hoà tan viên thuốc vào nửa cốc nước.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

4A Lô Lu - P. Trường Thạnh - Q9 - TP HCM - ĐT: 08.37300167 - Fax: 08.37301103
Email: info@qmmediphar.com - Web: WWW.QMmediphar.com

Viên nén sủi bọt UP-MISA

Công thức : cho 1 viên

Hoạt chất:

Acid ascorbic 1000 mg

Tá dược: Acid citric khan, natri bicarbonat khan, Sunset yellow, Kollidon K30, Aspatam, PEG 6000, Natri carbonat khan, Natri saccharin, Natri benzoate, Bột mùi cam, Ethanol 96% vừa đủ 1 viên.

Dược lực học :

Vitamin C cần cho sự tạo thành collagen, tu sửa mô trong cơ thể và tham gia trong một số phản ứng oxy hóa – khử. Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanine, tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamine, sắt, và một số hệ thống enzym chuyển hóa thuốc, trong sử dụng carbohydrat, trong tổng hợp lipid, và protein, trong chức năng miễn dịch, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, trong giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào.

Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbut, trong đó có sự sai sót tổng hợp collagen với biểu hiện là không lành vết thương, khiếm khuyết về cấu tạo răng, vỡ mao mạch gây nhiều đốm xuất huyết, đám bầm máu, chảy máu dưới da và niêm mạc (thường chảy máu lợi). Dùng vitamin C làm mất hoàn toàn các triệu chứng thiếu hụt vitamin C.

Dược động học :

- Hấp thu : Vitamin C được hấp thu dễ dàng sau khi uống. Tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn. Trong nghiên cứu trên người bình thường, chỉ có 50% của một liều uống 1,5 g vitamin C được hấp thu. Hấp thu vitamin C ở dạ dày – ruột có thể giảm ở người tiêu chảy hoặc có bệnh về dạ dày ruột.

Nồng độ vitamin C bình thường trong huyết tương ở khoảng 10 – 20 µg / ml. Dự trữ toàn bộ vitamin C trong cơ thể ước tính khoảng 1,5 g với khoảng 30 – 45 mg được luân chuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh scorbut thường trở nên rõ ràng sau 3 – 5 tháng thiếu hụt vitamin C.

- Phân bố : Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein.

- Thải trừ : Vitamin C oxy – hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid – 2 – sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Lượng vitamin C vượt quá nhu cầu của cơ thể cũng được nhanh chóng đào thải ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi. Điều này thường xảy ra khi lượng vitamin C nhập hàng ngày vượt quá 200 mg.

Chỉ định :

- Điều trị tình trạng thiếu Vitamin C

Cách dùng – Liều dùng :

- Chỉ dành cho người lớn 1 viên một ngày
- Dùng đường uống
- Hòa tan viên thuốc vào nửa cốc nước

Chống chỉ định :

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose – 6 – phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán) người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Thận trọng :

Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng lờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C. Uống liều lớn vitamin C trong khi mang thai đã dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C. Vitamin C có thể gây acid – hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu.

Người bệnh thiếu hụt glucose – 6 – phosphatdehydrogenase dùng liều cao vitamin C có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C.



Tác dụng không mong muốn :

- Tăng oxalate – niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhứt đầu, mất ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1 g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

- Thường gặp, ADR > 1/100

Thận : tăng oxalat niệu

- Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$

Máu : thiếu máu tan máu

Tim mạch : Bùng đỏ, suy tim

Thần kinh trung ương : xù, chóng mặt, nhứt đầu, mệt mỏi.

Dạ dày – ruột : Buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy.

Thần kinh – cơ và xương : Đau cạnh sườn.

Thông báo cho thấy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí :

Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

Tương tác với các thuốc khác:

- Dùng đồng thời theo tỷ lệ 200 mg vitamin C với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày – ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uống vào một cách đầy đủ mà không phải dùng đồng thời vitamin C.

- Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

- Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương. Sự acid – hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác .

- Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B₁₂ nên cần tránh uống vitamin C liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B₁₂

Phụ nữ mang thai và cho con bú

- *Phụ nữ có thai* : Vitamin C đi qua nhau thai. Chưa có nghiên cứu cả trên súc vật và trên người mang thai, và nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến scorbut ở trẻ sơ sinh

- *Phụ nữ cho con bú* : Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc : Không sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc do thuốc có thể gây chóng mặt, nhứt đầu.

Tiêu chuẩn: TCCS

Điều kiện bảo quản : Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng.

Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói : Hộp 1 tube x 10 viên nén sủi bọt

Ghi chú : (Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc)

“ Thuốc chỉ dùng theo đơn của bác sĩ ”

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin chi tiết xin hỏi ý kiến của Bác sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

04A Lò Lu – Phường Trường Thạnh – Q9 – TP.HCM

ĐT: 08.37300167 – Fax: 08.37301103

Email : Info@qmmediphar.com.vn - Web : WWW.Qmmediphar.com.vn



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Khu Thủy