

8/142


ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**MẪU HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN NÉN
USATANGENYLS**

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 08 / 11 / 13




Ngày 20... tháng 06... năm 2012
DUYỆT



GIÁM ĐỐC
Ds. Hồ Vinh Hiển

**MẪU HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN
USATANGENYLS**

Usatangenyls Acetyl DL leucin 500mg	Usatangenyls Acetyl DL leucin 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú 30 - 32 Phong Phú, P. 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh GMP-WHO
	CÔNG THỨC: Mỗi viên nén chứa: Acetyl DL leucin 500mg Tã được vỏ 1 viên CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Sản xuất tại: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM USARICHPHARM Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM ☎ 84 8 37547998 - 84 8 37547999
	Usatangenyls Acetyl DL leucin 500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú 30 - 32 Phong Phú, P. 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh GMP-WHO ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. DÙNG ĐƯỜNG UỐNG. Số lô SX: NSX : HD : TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK:  Mã vạch

Ngày ..20.. tháng ..06.. năm 2012


DUYỆT



GIÁM ĐỐC

Ds. Hồ Vinh Hiển

**MẪU VỈ 10 VIÊN NÉN
USATANGENYLS**



Ngày 20... tháng 06... năm 2012
DUYỆT



GIÁM ĐỐC
Ds. Hồ Vinh Hiển

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Viên nén USATANGENYLS

1. **Trình bày:** Hộp 20 viên (2 vỉ x10 viên), Hộp 100 viên(10 vỉx10 viên).

2. **Công thức:** Mỗi viên chứa: Acetyl DL leucin.....500 mg

Tá dược: tinh bột ngô, lactose , microcrystalin cellulose, PVP K₃₀, natri starch glycolat, talc, magnesi stearat

3. Chỉ định

Thuốc được dùng để điều trị chứng chóng mặt .

4. Liều dùng:

Liều lượng và cách dùng :

Người lớn: Trung bình 3-4 viên một ngày , chia làm 2 lần sáng và tối , Nên uống thuốc vào các bữa ăn.
Thời gian điều trị thay đổi tùy theo diễn biến lâm sàng . Vào đầu giai đoạn điều trị , hoặc khi điều trị không hiệu quả , có thể tăng liều lên.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHẢI TUYỆT ĐỐI THEO ĐÚNG TOA BÁC SĨ.

5. Chống chỉ định

-Dị ứng với acetyl leucine hay với một số các tá dược có trong thuốc .

6. Thận trọng:

Có thai và cho con bú :Khi có thai hoặc đang cho con bú nên báo cho bác sĩ biết.

7. Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc

-**Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:**

ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ THỂ XẢY RA VỚI NHIỀU LOẠI THUỐC , CẦN PHẢI THÔNG BÁO CHO CÁC BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ CỦA BẠN BẤT KỲ THUỐC ĐIỀU TRỊ NÀO KHÁC HIỆN ĐANG SỬ DỤNG.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú**

Khi có thai hoặc đang cho con bú nên báo cho bác sĩ biết.

- **Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Không thấy có tác dụng ảnh hưởng.

8. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Hiếm khi xảy ra : phát ban (đôi khi liên quan đến ngứa) , nổi mề đay.

NHƯ TẤT CẢ LOẠI THUỐC KHÁC THUỘC NÀY CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU Ở MỘT SỐ NGƯỜI KHI GẶP BẤT CỨ PHẢN ỨNG PHỤ NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RA TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC , XIN VUI LÒNG THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ .

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

9. Bảo quản, hạn dùng:

- Bảo quản: Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2012

Giám đốc



DS. Hồ Vĩnh Hiền

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh