

185 x 62mm

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Mephenesin.....500mg
Tá dược vđ.....1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK (Reg. No.):
Lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd):
Hạn dùng (Exp.):

Rx Thuốc bán theo đơn | Thuốc dùng trong bệnh viện

USNESIN 500

Mephenesin **500** mg



Chai 250 viên nén bao phim | Bottles of 250 film coated tablets

Composition: Each film coated tablet contains:

Mephenesin.....500mg
Excipients q.s.....1 tablet

Indications, contra-indications, dosage, administration:

Please refer to enclosed package insert.

Storage:

In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

Specification: In house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
Manufacturer:
US PHARMA USA CO., LTD
Lot B1-10, D2 Street, Tây Bắc Củ Chi Industrial Zone, HCMC





Thuốc bán theo đơn

USNESIN 500

Viên nén bao phim Mephenesin 500mg

Thành phần

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Mephenesin.....500mg

Tá dược: Calci carbonat nặng, Polyvinyl pyrrolidon (PVP K30), Magnesi stearate, Natri starch glycolate, Polyethylen glycol (PEG) 6000, Hydroxypropylmethyl cellulose 606 (HPMC), Hydroxypropylmethyl cellulose 615 (HPMC), Titan dioxyd, Talc, Polyethylen glycol 6000, Màu Sunset yellow lake, Màu Erythrosin lake.

Phân loại

Thuốc giãn cơ.

Dược lực, cơ chế tác dụng

Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương.

Dược động học

Sau khi uống, Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ở hầu hết các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ.

Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan.

Mephenesin có nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi.

Chỉ định

USNESIN 500 (Mephenesin) được đề nghị điều trị hỗ trợ các trường hợp co rút cơ gây đau như:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, vẹo cổ, đau vùng thắt lưng.
- Các tình trạng co rút cơ xương khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.

Uống 1-2 viên/ lần x 3 lần / ngày.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng:

Các tác dụng ngoại ý có liên quan thuốc thường sẽ nặng lên khi dùng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương.

Tương tác thuốc

Tác động lên hệ thần kinh trung ương của USNESIN 500 có thể gia tăng bởi rượu hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng thuốc này trong thời gian mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Không dùng thuốc này trong thời gian cho con bú.

Ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc:

Vì thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người bệnh sử dụng USNESIN 500 (Mephenesin) không được lái xe và vận hành máy móc.



Handwritten signature

Tác dụng phụ

Thường gặp, $ADR > 1/100$

Mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động

Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$

Đau khớp, đau người, buồn nôn, bức tức, ỉa chảy, táo bón, nổi mẩn.

Hiếm gặp, $ADR < 1/1000$

Phản ứng dị ứng. Sốc phản vệ rất hiếm hữu xảy ra. Ngủ gà, phát ban.

Hướng dẫn cách xử trí ADR : Giảm liều hoặc ngừng điều trị bằng Mephenesin.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng:

- Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê.

- Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già.

Điều trị:

- Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩn thận về hô hấp, mạch và huyết áp.

- Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu.

- Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợ chung, đảm bảo thông khí, truyền dịch.

- Có thể điều trị ức chế hệ thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điều trị thích hợp.

- Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa.

Dạng trình bày

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim, chai 250 viên nén bao phim.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C .

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Công Ty TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 38230108



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng