

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/8/2014

Indication, contraindication, administration dosage and other information: See the leaflet enclosed.
Specification: In-house.
Storage: Keep in a dry place, below 30°C, protected from light
KEEP OUT OF REACH THE CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE
SBK/Reg.No :
Số lô SX
Ngày sx
Hạn dùng



Hộp 10 vỉ x10 viên nang cứng

VI NANG
CETIRIZIN
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

VI NANG
CETIRIZIN
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang).....10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Bảo quản: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

VI NANG
CETIRIZIN
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Hộp 10 vỉ x10 viên nang cứng

VI NANG
CETIRIZIN
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

VI nang CETIRIZIN Vi nang **CETIRIZIN** Số lô SX: HD
 Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang).....10mg HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
VI nang CETIRIZIN Vi nang **CETIRIZIN**
 Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang).....10mg HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Indication, contraindication, administration dosage and other information: See the leaflet enclosed.

Specification: In-house.

Storage: Keep in a dry place, below 30°C, protected from light

KEEP OUT OF REACH THE CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE

SĐK/Reg.No :

Số lô SX

Ngày sx

Hạn dùng



Hộp 5 vỉ x10 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

VI NANG
CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang).....10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



VI NANG
CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Hộp 5 vỉ x10 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHAN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid
(dưới dạng vi nang)10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều
dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Lọ 100 viên nang cứng
VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:



Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg
CETIRIZIN
VI NANG

Hộp 1 lọ x 100 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều
dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Hộp 1 lọ x 100 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng

SĐK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHAN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Вітамін С (Вітамін С) (Вітамін С) (Вітамін С)
CETIRIZIN
VI NANG

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập. Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Lọ 200 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Thuốc dùng cho bệnh viện

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Hộp 1 lọ x 200 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập. Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

Hộp 1 lọ x 200 viên nang cứng

VI NANG

CETIRIZIN

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Thuốc dùng cho bệnh viện



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập. Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHAN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Thành phần cho 1 viên Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821	Lọ 500 viên nang cứng VI NANG CETIRIZIN Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg Thuốc dùng cho bệnh viện	Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Đề xa tầm tay của trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SĐK: Ngày SX: Số lô SX: HD:
--	--	--

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg

VI NANG

CETIRIZIN

Hộp 1 lọ x 500 viên nang cứng VI NANG CETIRIZIN Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg	Thành phần cho 1 viên Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821	Hộp 1 lọ x 500 viên nang cứng VI NANG CETIRIZIN Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)10mg	Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Đề xa tầm tay của trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SĐK: Ngày SX: Số lô SX: HD: Thuốc dùng cho bệnh viện  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821
---	--	---	---

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VI NANG CETIRIZIN

Công thức: Cho 1 viên

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang)

10 mg

Tá dược

vừa đủ 1 viên

(Tinh bột sắn, Đường trắng, Titan dioxyd, Talc, Natri carboxymethylcellulose, Povidon, Nước tinh khiết, Nang)

Đặc tính dược lực học:

Cetirizin là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ ở liều được lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H_1 , nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

Đặc tính dược động học:

Nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liều 10 mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể.

Độ thanh thải ở thận là 30 ml/phút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên kết mạnh với protein huyết tương (khoảng 93%).

Chỉ định điều trị:

Cetirizin được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

Cách dùng - Liều dùng:

Cetirizin có thể uống cùng hoặc ngoài bữa ăn.

Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 1 viên /ngày

Chống chỉ định:

- Những người có tiền sử dị ứng với cetirizin, với hydroxyzin

Thận trọng:

- Cần phải điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm phân thận nhân tạo.

- Cần điều chỉnh liều ở người suy gan.

- Ở một số người bệnh sử dụng cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm. Tránh dùng đồng thời cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, vì làm tăng thêm tác dụng của các thuốc này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tuy cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng khi có thai.

Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.



Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Có thể gây hiện tượng ngủ gà vì vậy không nên sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Thường gặp: Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỷ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.

Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

- Ít gặp: Chán ăn hoặc tăng thêm ăn, bí tiểu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt.

- Hiếm gặp: Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm cầu thận.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với các thuốc khác:

Đến nay chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophylin..

Tương kỵ: Hầu như không có tương kỵ với các thuốc khác

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng của quá liều là: ngủ gà ở người lớn; ở trẻ em có thể bị kích động. Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Báo ngay cho bác sĩ khi bị quá liều.

Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 200 viên, lọ 500 viên. hộp 1 lọ.

Vi Al/ PVC 10 viên x hộp5 vi

Vi Al/ PVC 10 viên x hộp10 vi

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

**ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 039.856605/854617 Fax: 039.856821. Email: hatipharco@hn.vnn.vn.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng