


MẪU HỘP DUNG DỊCH NHỎ MẮT VIFTICOL

Kích thước hộp thực : 2,8 cm x 7,0cm x 2,8 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013




Ngày 24 tháng 5 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Từ

MẪU NHÃN DUNG DỊCH NHỎ MẮT VIFTICOL

Kích thước nhãn thực : 7,4 cm x 2,0 cm



Ngày 24 tháng 5 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT VIFTICOL

Kích thước thực : 9,2 cm x 18,0 cm

Vifticol 1%

DUNG DỊCH NHỎ MẮT

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 10 ml

- Glycerol 100 mg

- Tá dược: Acid boric, Natri borat, Dinatri edetat (EDTA dinatri), Kali clorid, Natri clorid, Kali sorbat, Nước cất.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

- Glycerol là một tác nhân loại nước qua thẩm thấu, có các đặc tính hút ẩm và làm trơn . -
- Ngoài ra, glycerol cũng có tính sát trùng và làm dịu mắt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Glycerol chuyển hóa ở gan, 20% chuyển hóa ở thận. Chỉ có một phần nhỏ thuốc không chuyển hóa đào thải qua nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH:

- Ngăn ngừa và giảm hiện tượng mỏi mắt, khô mắt, căng thẳng khi sử dụng máy tính, xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Không chạm tay vào đầu chai thuốc khi mở nắp để tránh làm bẩn dung dịch bên trong và đáy nắp chai thuốc sau khi dùng.

- Tháo kính áp tròng khi nhỏ mắt.

- Chỉ sử dụng 15 ngày sau khi mở nắp. Không dùng khi dung dịch đổi màu hoặc trở nên đục.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

THỜI KỲ MANG THAI:

- Tính an toàn của thuốc chưa được xác định.

- Glycerol có thể sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu thực sự cần thiết.

THỜI KỲ CHO BÚ:

- Chưa được biết Glycerol có vào sữa hay không và tính an toàn của thuốc chưa được xác định nên phải thận trọng đối với phụ nữ cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

- Vifticol 1% khi dùng quá liều không ảnh hưởng tới sức khỏe nên không cần có biện pháp xử lý.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa có tài liệu nghiên cứu.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Các triệu chứng thường gặp khi uống hoặc tiêm là buồn nôn, nôn, đau đầu, lú lẫn, mất định hướng. Trong trường hợp dùng nhỏ mắt chỉ có tác dụng tạm thời, các tác dụng không mong muốn chưa có tài liệu nào để cập tới.

- Thông báo ngay cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc..

CÁCH DÙNG:

Nhỏ 1-2 giọt vào mỗi bên mắt khi cần.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 10 ml.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Dung dịch nhỏ mắt VIFTICOL 1% đạt theo TCCS.

- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 37422612 - 39770965


Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 24 tháng 5 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh



DS. Lê Thanh Sử