

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VITAMIN B1 250 mg

GMP-WHO

Viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Thiamin nitrat 250 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

(Tá dược gồm: Magnesi stearat, tinh bột mì, acid citric, lactose, talc).

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh do thiếu hụt vitamin B1. Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff. Bệnh viêm đa dây thần kinh do nghiện rượu hoặc thiếu dinh dưỡng do nhiễm độc. Dùng liều cao trong hội chứng đau do thấp khớp hay thần kinh.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Uống thuốc với một ít nước.

Điều trị thiếu vitamin B1: 1 - 2 viên/ngày. Điều trị các hội chứng đau nhức: 1 - 4 viên/ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với vitamin B1

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: *Người mang thai:* Không có nguy cơ nào được biết. Khẩu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1.5 mg thiamin. Thiamin được vận chuyển tích cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nồng độ thiamin trong thai và trẻ sơ sinh cao hơn mẹ. Thai có hội chứng nhiễm rượu (do mẹ nghiện rượu) phát triển rất chậm trong tử cung là do thiếu thiamin do rượu gây ra. *Người cho con bú:* Mẹ dùng thiamin vẫn tiếp tục cho con bú được. Khẩu phần thiamin hàng ngày trong thời gian cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp đầy đủ, thì không cần phải bổ sung thêm thiamin. Chỉ cần bổ sung thiamin nếu khẩu phần ăn hằng ngày không đủ.

Người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Vitamin B1 có thể được dùng phối hợp với vitamin B6 và vitamin B12, hoặc phối hợp trong viên nén, viên bao đường với các vitamin khác và các muối khoáng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng. Bình thường do thiamin tăng cường tác dụng của acetylcholin, nên một số phản ứng da có thể coi như phản ứng dị ứng. *Hiếm gặp:* Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn, tăng huyết áp cấp. Ban da, ngứa, mày đay. Khó thở.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

ĐƯỢC LỰC HỌC: Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chí ở liều cao. Thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - cetooglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu hụt thiamin, sự oxy hóa các alpha - cetoacid bị ảnh hưởng, làm cho nồng độ pyruvat trong máu tăng lên, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu thiamin.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Sự hấp thu thiamin trong ăn uống hằng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na⁺. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế. Ở người lớn, khoảng 1mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa biến hóa sẽ tăng hơn.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ hoặc tác dụng không mong muốn.

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Bảo quản: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

VPC
PHARIMEXCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9 - Phường 5 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Cơ sở xin đăng ký

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. Tổng Giám Đốc



Th.S Nguyễn Hữu Trung

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

MẪU NHÃN THUỐC
VỈ 10 VIÊN

Trang: 1 / 1
Mã số: NCD.006.00
Số: 26.02.11

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:
Thiamin nitrat..... 250 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Uống thuốc với một ít nước. Điều trị thiếu vitamin B1
Uống: 1 - 2 viên/ngày. Điều trị các hội chứng đau nhức: 1- 4 viên/ngày

SDK:.....
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9, P 5, TPVL, Tỉnh Vĩnh Long

GMP-WHO

**Vitamin
B1 250 mg**

CHAI 100 VIÊN NANG CỨNG

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Cơ sở xin đăng ký
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. Tổng Giám Đốc

Th.S. Nguyễn Hữu Trung

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

MẪU HỘP THUỐC


HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN

Nhãn trung gian:

Trang: 1 / 1

Mã số: NCD.006.00

Số: 26.02.11



Cơ sở xin đăng ký

KI TỔNG GIÁM ĐỐC

P. Tổng Giám Đốc

Th.S. Nguyễn Hữu Trung

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

MẪU NHÃN THUỐC
VĨ 10 VIÊN

Trang: 1 / 1
Mã số: NCD.006.00
Số: 26.02.11

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:



Cơ sở xin đăng ký
KT TỔNG GIÁM ĐỐC
P. Tổng Giám Đốc



Th.S. Nguyễn Hữu Trung