

* Nhân trên vỉ 10 viên: (góp ý lần 1)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

VITAMIN E
400IU

Viên nang mềm

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat) ... 400 IU

Soft capsules

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat) ... 400 IU

Viên nang mềm

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat) ... 400 IU

Soft capsules

Vitamin E (dl-alpha
tocopheryl acetat) ... 400 IU

DHG PHARMA

Số lô SX: HD:



* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên: (góp ý lần 1)



Soft capsules
VITAMIN E
400IU

GMP - WHO
VITAMIN E
400IU
Soft capsules
Viên nang mềm
BOX OF 10 BLISTERS X 10 SOFT CAPSULES
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
DHG PHARMA

Để XA TẮM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG,
BẢO QUẢN NƠI KHÖ,
NHÉT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ANH SÁNG

VITAMIN E
400IU
Viên nang mềm

SBN (Reg. No.):



Size 70%



[Handwritten signature]

VITAMIN E
400IU
Soft capsules

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
708 Bô, Ngã Ba, H. P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209

THÀNH PHẦN:
Vitamin E (d- α -tocopherol acetate) ... 400 IU
Tương đương với ... 1000 IU
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E
(do thiếu vitamin E, trẻ em bị suy dinh dưỡng
hoặc bệnh nhân mắc bệnh gan mật có rối loạn chức năng
mật hoặc thiếu carnitine bẩm sinh).
Các dấu hiệu thiếu vitamin E, gồm các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như giảm phản xạ,
động cơ bất thường, giảm nhạy cảm với rung
động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, viêm
viêm mạch ngoại vi, rối loạn thị giác thị lực.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E:
Uống 1 viên x 1 lần ngày, sau bữa ăn.
CÁC TRUYỀN TIN MẮC:
Quá mẫn và các phản ứng dị ứng.
Xét độc trong trường hợp dị ứng.

COMPOSITION:
Vitamin E (d- α -tocopherol acetate) ... 400 IU
Equivalent to ... 1000 IU
INDICATIONS: Treatment and prevention of
vitamin E deficiency (poor dietary intake of
vitamin E, children with pancreatic, cirrhotic or
biliary malabsorption due to biliary atresia or
cholestasis, prematurity, very low
birth-weight infants).
The main signs of vitamin E deficiency are the
development of myopathic and neurological
disorders such as hyporeflexia, gait
abnormalities, hypersensitivity to vibrations and
personal sensations, ophthalmoplegia,
retinopathy, and degeneration.
DOSEAGE & ADMINISTRATION:
For treatment and prevention of vitamin E
deficiency: the recommended dose is 1 soft
capsule once daily after meals.
CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to one
of the components of the drug.
OTHER INFORMATION:
Please see the enclosed leaflet.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
STORAGE: STORE IN DRY PLACES,
NOT EXCEEDING 30°C, PROTECT FROM LIGHT.

VITAMIN E
400IU
Soft capsules

Mã phân phối và đăng ký:
0710.389000
www.dhgpharma.com.vn

Nhãn SE (Reg. No.):
819352061017779
ĐT: (0710) 3891433
Fax: (0710) 3895209

