

84/D137

Mephenesin 250mg

Yteconcyll

R_x Prescription drugs

USP
US PHARMA

Yteconcyll

Mephenesin 250mg

*Keep out of reach of children.
Read the package insert carefully before use.*

ADJUVANT TREATMENT FOR PAINFUL MUSCLE CONTRACTURES

Box of 2 blisters x 25 film coated tablets

Exclusive Distributor:
HCM CITY MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CO.
ADDRESS: 181 NGUYỄN ĐÌNH CHIEU WARD 5, DISTRICT 3, HCM CITY

Manufacturer: US PHARMA USA COMPANY LIMITED
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lan đầu: 20/12/2012

Mephenesin 250mg

Yteconcyll

R_x Thuốc bán theo đơn

USP
US PHARMA

Yteconcyll

Mephenesin 250mg

*Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ ĐAU DO CƠ THẤT CƠ

Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim

Phân phối độc quyền:
CÔNG TY TNHH YTECONCYLL
GIÁ CHẾ 181 NGUYỄN ĐÌNH CHIEU P.03 TP. HCM

Nhà sản xuất: Công Ty TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. HCM.


SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd.):
HĐ (Exp.):

Thành phần:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Mephenesin.....250mg
Tá dược v.d.....1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.
*Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*



R_x Thuốc bán theo đơn



YTECONCYL

Viên nén bao phim Mephenesin 250mg

Thành phần

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Mephenesin250mg

Tá dược: Lactose, tinh bột ngô, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, natri starch glycolate, Aerosil, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 606, Titan dioxyd, Polyethylen glycol 6000, Màu Sunset yellow lake, Màu Erythrosin lake, Màu Red ion oxyd, Talc.

Phân loại

Thuốc giãn cơ.

Dược lực, cơ chế tác dụng

Thuốc thư giãn cơ có tác động trung ương.

Dược động học

Sau khi uống, Mephenesin được hấp thu nhanh. Nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 1 giờ. Thời gian bán thải là 3/4 giờ. Mephenesin được chuyển hóa mạnh và được đào thải chủ yếu qua nước tiểu.

Chỉ định

YTECONCYL (Mephenesin) được đề nghị điều trị hỗ trợ các trường hợp co rút cơ gây đau như:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, vẹo cổ, đau vùng thắt lưng.
- Các tình trạng co rút cơ xương khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 15 tuổi.

Uống 2 - 4 viên x 3 lần / ngày.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng:

Các tác dụng ngoại ý có liên quan thuốc thường sẽ nặng lên khi dùng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương.

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng thuốc này trong thời gian mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Không nên dùng thuốc này trong thời gian cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc có thể gây buồn ngủ nên thận trọng đối với người lái xe và điều khiển máy móc.

Tương tác thuốc

Tác động lên hệ thần kinh trung ương của YTECONCYL có thể gia tăng bởi rượu hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Tác dụng phụ

Một vài trường hợp ngoại lệ được ghi nhận có gây sốc phản vệ.

Hiếm khi bị buồn ngủ, buồn nôn, nôn, dị ứng da.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:



Triệu chứng : giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, không phối hợp được động tác, liệt hô hấp.

Cấp cứu : chuyển ngay đến bệnh viện và điều trị triệu chứng.

Dạng trình bày

Hộp 2 vỉ, vỉ 25 viên.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Công Ty TNHH US Pharma USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 38230108



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Toanh