

MẪU HỘP 1 vỉ x 10 viên
ZIBPO - Vị bạc hà



Ngày 18 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Thành

MẪU HỘP 2 vỉ x 10 viên
ZIBPO - Vị bạc hà



Ngày 18 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Thành

MẪU HỘP 3 vỉ x 10 viên
ZIBPO - Vị bạc hà




Ngày 18 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Thành

MẪU VIÊN: 10 viên
Viên ngậm Zibpo vị bạc hà



Ngày ..18... tháng ..10... năm ..2022

Giám đốc



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Thành

ZIBPO

Để xa tầm tay trẻ em,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén ngậm chứa:

Thành phần hoạt chất:

Dequalinium Chloride 0,25 mg

Thành phần tá dược:

Sorbitol, Aspartame, Tinh dầu bạc hà, Menthol, Polyethylene glycol 6000, Magnesium stearate.

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén ngậm.

Viên nén tròn, màu trắng, mùi bạc hà, hai mặt khum, trơn.

DƯỢC LỰC

Mã ATC: R02AA02

Dequalinium chloride là một chất khử trùng amoni bậc bốn hoạt động chống lại nhiều vi khuẩn gram dương và gram âm, nấm men và nấm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Chưa có thông tin.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tại chỗ hầu hết các bệnh nhiễm trùng miệng phổ biến bao gồm: Viêm họng Vincent, viêm họng, đau họng, viêm amidan, viêm miệng, loét áp tơ, tưa miệng, viêm lưỡi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều lượng

Liều thấp nhất có hiệu quả nên được sử dụng trong thời gian ngắn nhất khi cần giảm triệu chứng và nếu triệu chứng vẫn tồn tại hoặc xấu hơn nên gặp bác sĩ tư vấn.

Người lớn: Ngậm 1 viên mỗi 2 – 3 h, không quá 8 viên trong 24 h.

Trẻ em:

- + Trẻ em > 10 tuổi: Dùng như người lớn.
- + Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: Không chỉ định.
- + Trẻ em dưới 6 tuổi: Chống chỉ định.

Bệnh nhân cao tuổi: Không cần giảm liều ở người cao tuổi.

Cách dùng: Ngậm thuốc đến khi tan từ từ trong miệng.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- + Nhạy cảm với dequalinium chloride hay bất cứ thành phần nào trong công thức.
- + Trẻ em dưới 6 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- + Sau 3 ngày sử dụng, nếu triệu chứng vẫn còn, không cải thiện hoặc tệ hơn nên gặp bác sĩ tư vấn.
- + Không nên sử dụng vượt quá liều khuyến cáo.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Sự an toàn của việc sử dụng thuốc khi mang thai chưa được thiết lập, nhưng được xem xét không nguy hiểm. Để phòng ngừa, tốt nhất tránh sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai trừ khi thực sự cần thiết. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Phụ nữ cho con bú

Chưa có đủ thông tin về sự bài tiết của dequalinium chloride hoặc chất chuyển hóa trong sữa mẹ. Không thể loại trừ nguy cơ cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Khả năng sinh sản

Không có thông tin về ảnh hưởng của dequalinium chloride đến khả năng sinh sản.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ

Tương tác

Không có tương tác thuốc lâm sàng nào được ghi nhận.

Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn liên quan đến dequalinium chloride được phân nhóm theo tần suất:

Rất thường gặp: ($ADR \geq 1/10$); *thường gặp* ($1/100 \leq ADR < 1/10$); *ít gặp* $1/1000 \leq ADR < 1/100$); *hiếm gặp* ($1/10.000 \leq ADR < 1/1000$); *rất hiếm gặp* ($ADR < 1/10.000$); *chưa rõ tần suất* (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).



+ **Rối loạn hệ miễn dịch**

Chưa rõ tần suất: Quá mãn.

+ **Rối loạn hệ tiêu hóa**

Chưa rõ tần suất: Đau lười.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Không có triệu chứng quá liều nào khác ngoài khó chịu đường tiêu hóa.

Cách xử trí

Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. Gặp bác sĩ tư vấn nếu gặp tình trạng quá liều.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên. Hộp 3 vi (PVDC/Alu).

Vi 10 viên. Hộp 2 vi (PVDC/Alu).

Vi 10 viên. Hộp 1 vi (PVDC/Alu).

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:

Tên cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN**

521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ THUỐC:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE

Phòng 09, Lầu 10, Tòa nhà The EverRich 1, số 968, Đường 3 tháng 2, F.15, Q.11, TP. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc



GIAM ĐOC
Bùi Minh Thành

