

Hướng dẫn sử dụng

HAISAMIN®

Dạng thuốc: Viên nang mềm.

Thành phần:

Hải sâm (<i>Holothuria vagabunda</i>)	200	mg
Tá dược	vừa đủ	1 viên

(Tá dược gồm : Dầu đậu nành, dầu cọ, , sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin, dung dịch Sorbitol 70%, nipagin, nipasol, titan dioxyd, vanilin, màu brown HT, ethanol 90%, nước tinh khiết).

Tác dụng:

Theo đông y Hải sâm có tác dụng bổ thận, bổ âm, tráng dương, ích tinh, thông trường nhuận táo. Trong Hải sâm có chứa protein (thành phần chủ yếu là Arginin, xystin...), lipit glucit và các nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, sắt, kali... có tác dụng tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi. Hải sâm có hàm lượng Testosteron tương đối cao, nhiều gấp 3 lần so với trong yến sào, Progessteron nhiều gấp 2 lần so với trong yến sào do đó Hải Sâm có tác dụng tăng cường khả năng sinh dục của nam giới và rất tốt với phụ nữ tiền mãn kinh (Theo “*Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam*” - GS. Đỗ Tất Lợi).

Hải sâm có tác dụng lớn trong việc phòng và chữa bệnh xơ vữa động mạch. Hải sâm ức chế sự phân chia tế bào, do đó có khả năng phòng ngừa được ung thư (theo “*Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 1*” - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật).

Chỉ định:

Dùng cho những trường hợp cần tăng cường sinh lực: Vận động viên thể thao, người hoạt động với cường độ cao, người làm việc trí óc căng thẳng, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, người bị stress, người mới ốm dậy, người già yếu, sau phẫu thuật, nam giới yếu sinh lý, ít tinh trùng, phụ nữ tiền mãn kinh.

Dùng cho người có nguy cơ bị xơ vữa động mạch, người bị xơ vữa động mạch, người có nguy cơ bị ung thư cao và những người mắc bệnh ung thư đang được điều trị.

Liều dùng - Cách dùng:

Uống 2 viên/lần, 2-3 lần/ngày. Đợt dùng kéo dài từ 1 - 2 tháng.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Không có

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo

Qui cách đóng gói: Hộp 6 vi, 12 vi x 5 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên nang mềm; kèm theo hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng - Tp Hải Dương