

155

Lần đầu: 05 / 09 / 2016



Vasomin 500




10 VỈ X 10 VIÊN NỀN BAO PHIM

10 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Glucosamin hydrochlorid	500mg
(tuong duong Glucosamin)	415.6mg

Hộp 20 vỉ x.10 viên nén bao phim



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vasomin 500

20 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.


Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP WHO



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vasomin 500

20 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vacopharm

50 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 195/4, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com





Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Vacopharm

50 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)




Vacopharm

Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vacopharm

100 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.


Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP WHO



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vacopharm

100 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN





Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)


Vacopharm

100 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

vacopharm

5 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.


LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Mọi thông tin chi tiết xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

GMP WHO



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

vacopharm

5 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

vacopharm

5 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vacopharm

10 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP WHO



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Vacopharm

10 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Vacopharm


10 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim



Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

25 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.


Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP WHO



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

25 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM


Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN






Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))



Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Vacopharm

50 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM



THÀNH PHẦN

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.629.311 • Fax: (072) 3.622.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

GMP WHO



Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Vacopharm

50 VỈ X 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN





Vasomin 500
(tương đương Glucosamin 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg))

Vacopharm

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên

Số lô SX: HD:
Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg

Nhãn vỉ 20 viên

Số lô SX: HD:
Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng


 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)

Độc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

 **GMP - WHO**
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Vasomin 500
Glucosamin hydroclorid 500mg



2. Nhận trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

100 VIÊN NÉN BAO PHIM

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



VACOPHARM
TÂN AN - T. LONG AN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

200 VIÊN NÉN BAO PHIM

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



VACOPHARM
TÂN AN - T. LONG AN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 300 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

300 VIÊN NÉN BAO PHIM

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



VACOPHARM
TÂN AN - T. LONG AN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

500 VIÊN NÉN BAO PHIM

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



Vacopharm

1100112419 - C

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi.
Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

1000 VIÊN NÉN BAO PHIM

Vasomin 500

Glucosamin hydroclorid 500mg
(tương đương Glucosamin 415,6mg)



Vacopharm

1100112419 - C

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

VASOMIN 500**Thành phần**

Glucosamin hydroclorid	500mg
(tương đương Glucosamin	415,6mg)
Tá dược v.đ	1 viên nén bao phim

(Pregelatinized starch, Polyvinyl pyrrolidon K30, Aerosil, Magnesi stearat, Croscarmellose natri, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Talc, Titan dioxyd, Màu Quinolin yellow, Màu Tartrazin, Màu Caramel, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 300 viên
12	Đóng chai 500 viên
13	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Glucosamin tham gia quá trình tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một amino-monosaccharid, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là muco-polysaccharid, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamin sulfat đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholinase A₂ và giảm các gốc tự do superoxid phá hủy các tế bào sụn. Glucosamin còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.

Do glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Dược động học

Sau khi uống, thuốc hấp thu qua đường tiêu hóa 88,7%.

Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 9 giờ.

Thuốc phân bố qua gan, thận, các mô, kể cả sụn khớp.

Thuốc chuyển hóa lần đầu qua gan là 45%. Sinh khả dụng tuyệt đối là 44%.

Chỉ định

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều dùng và cách dùng

Dùng cho người trên 18 tuổi.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định

Dị ứng với glucosamin và các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng

Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông cần thận trọng và có sự theo dõi của Bác sĩ.

Glucosamin thuộc nhóm carbohydrat. Vì vậy cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên bệnh nhân tiểu đường.

Tác dụng không mong muốn

Khó chịu ở bụng, buồn ngủ, mất ngủ, đau đầu, phản ứng ở da và nhạy cảm với ánh nắng. Hiếm khi rối loạn dạ dày ruột: buồn nôn, khó tiêu, cảm giác nóng ở ngực, nôn, táo bón, tiêu chảy, chán ăn.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ trong trường hợp khó thở hay khó chịu ở họng và ngực, đau ngực, phát ban da, nổi mẩn hay ngứa.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Tương tác thuốc: chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí

Biểu hiện: có thể bao gồm đau đầu, chóng mặt, mất phương hướng, đau khớp, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón.

Xử trí: Trong trường hợp quá liều, ngưng sử dụng thuốc. Bệnh nhân nên được theo dõi và điều trị triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

Long An, ngày 24 tháng 12 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty
Phó Tổng Giám đốc



K.S. Phan Thị Minh Thu



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

