


* Mẫu nhãn hộp



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa

Cao khô lá bạch quả chuẩn hóa (Standardized *Ginkgo biloba* leaf extract) 40 mg
 Tương đương Lá Bạch quả (*Ginkgo biloba*)..... 2000 mg
 Tá dược..... vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, CÁC THÔNG TIN KHÁC : Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.



**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG**

SDK: VD-xxxx-xx

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM

SỐ LỘ SX:

Ngày SX:

HD:



MEBIPHAR

Hộp 02 vỉ x vỉ 15 viên nén bao phim

Vipkan

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ (GINKGO BILOBA) CHUẨN HÓA 40mg



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
Lô II, 18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

* Mẫu vĩ



Bo 1/1, 17



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIPKAN

Cao khô lá bạch quả chuẩn hóa (Bốn mươi miligam)	40 mg
(Standardized <i>Ginkgo biloba</i> leaf extract)	
Tương đương Lá Bạch quả (<i>Ginkgo biloba</i>)	2000 mg
Tá được vừa đủ	1 viên

Tinh bột bắp, Avicel M102, Cellactose 80, Sachellac 80, Gôm Arabic, Bột Talc, Magnesi stearat, Aerosil, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Titan dioxyd, Màu đỏ sắt (III) oxyd, Màu sắt (II) oxyd, Màu đỏ Ponceau 4R lake.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng cho bệnh lý suy giảm nhận thức và thần kinh cảm giác mạn tính ở người lớn tuổi (ngoại trừ bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ khác).
- Điều trị triệu chứng đau cách hồi trong bệnh động mạch chi dưới (giai đoạn 2).
- Điều trị phụ trợ trong giảm thị lực và một số rối loạn về thị giác được cho là có nguyên nhân từ mạch máu.
- Điều trị phụ trợ trong giảm thính lực và một số hội chứng chóng mặt và/ hoặc ù tai được cho là có nguyên nhân từ mạch máu.
- Hỗ trợ điều trị chung bệnh Raynaud.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Uống thuốc trong bữa ăn, nuốt trọn viên thuốc, không bẻ và không nhai.
- Người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai, đang chảy máu nhiều, người đang có rối loạn đông máu.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

- Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp, phụ nữ mang thai.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Thận trọng khi sử dụng kết hợp *Ginkgo biloba* với các thuốc chống đông khác tác động lên việc kết tập tiểu cầu như warfarin, ticlopidin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, nổi mẩn, nhức đầu.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

* Thời kỳ mang thai: chưa có báo cáo về tính an toàn trong việc dùng thuốc cho phụ nữ mang thai, do đó không được chỉ định thuốc trong thời kỳ mang thai.

* Thời kỳ cho con bú: chưa có dữ liệu lâm sàng phù hợp, không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều.

ĐÓNG GÓI: Vỉ 15 viên - Hộp 02 vỉ

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
Lô III- 18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng