


MẪU NHÃN VIÊN NÉN DÀI VITAMIN B1 250 MG

1. VỈ 10 viên



2. HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIÊN NÉN DÀI

VITAMIN B₁ 250 MG

Công thức: Tính cho 1 viên nén dài:

Thành phần	Hàm lượng
Thiamin mononitrat	250 mg
Tinh bột sắn	186 mg
Lactose	150 mg
Saccarose	48 mg
PVP (Polyvinylpyrrolidon)	13 mg
Magnesi stearat	6,5 mg
Talc	6,5 mg



Các đặc tính dược lực học:

Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý. Khi vào cơ thể sẽ chuyển thành dạng thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển hoá carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha-cetoacid như pyruvat và alpha-cetoglutarat cũng như trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat.

Các đặc tính dược động học:

Sự hấp thu thiamin qua đường tiêu hoá là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na⁺. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hoá cao, sự khuếch tán thụ động rất quan trọng.

Sau khi hấp thu, thiamin phân bố vào đa số các mô và sữa. Thiamin được chuyển hoá ở các mô. Ở người lớn, mỗi ngày có khoảng 1mg thiamin bị giáng phân và đây là lượng thiamin tối thiểu cần hàng ngày.

Khi hấp thu ở mức thấp, hầu như không có thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi thừa sẽ được thải trừ qua nước tiểu ở dạng thiamin nguyên vẹn.

Chỉ định điều trị:

- Điều trị bệnh thiếu vitamin B₁ như bệnh beri beri.
- Viêm đa dây thần kinh.

Liều dùng:

- Beri beri thể nặng: 1 viên / lần x 1- 2 lần/ ngày.
- Viêm đa dây thần kinh: 1-2 viên/ lần x 1-2 lần / ngày.

Chống chỉ định:

Các trường hợp quá mẫn cảm với thiamin và các thành phần khác của thuốc.

Tương tác thuốc:

Chưa có tài liệu nào cho thấy có sự tương tác thuốc giữa thiamin với các thuốc khác.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- *Thời kỳ mang thai:* Không có nguy cơ nào được biết. Khẩu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg thiamin.
- *Thời kỳ cho con bú:* Mẹ dùng thiamin vẫn tiếp tục cho con bú được. Khẩu phần ăn hàng ngày trong thời gian cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp đầy đủ, thì không cần bổ sung thêm thiamin.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm gặp và thường theo kiểu dị ứng.

"Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Sử dụng quá liều: Chưa có thông tin.


Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN IV.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ “

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
Đường Hữu nghị - TP Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam.
ĐT: (052) 3822475 - 3822346 - 3820084
Fax: 052. 3820720

Ngày ...5... tháng ...8.... năm 2011.

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ds. Nguyễn Thị Mai

THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: VITAMIN B₁ 250 MG

2. Mô tả sản phẩm: Viên nén dài màu trắng, mùi đặc trưng, thành và cạnh viên láng lẵn.

3. Thành phần thuốc:

Thành phần	Hàm lượng
Thiamin mononitrat	250 mg
Tinh bột sắn	186 mg
Lactose	150 mg
Saccharose	48 mg
PVP (Polyvinylpyrrolidon)	13 mg
Magnesi stearat	6,5 mg
Talc	6,5 mg

4. Hàm lượng thuốc: Thiamin mononitrat 250 mg

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Điều trị bệnh thiếu vitamin B₁ như bệnh beri beri.
- Viêm đa dây thần kinh.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Beri beri thể nặng: 1 viên / lần x 1- 2 lần/ ngày.

Viêm đa dây thần kinh: 1-2 viên/ lần x 1-2 lần / ngày

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Các trường hợp quá mẫn cảm với thiamin và các thành phần khác của thuốc.

8. Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm gặp và thường theo kiểu dị ứng như: ban da, ngứa, mề đay,...

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Nên dùng thuốc trong bữa ăn để tăng khả năng hấp thu của thuốc.

10. Cần làm gì khi một lần quên thuốc: Không ảnh hưởng

11. Cần bảo quản thuốc như thế nào: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Chưa có thông tin

13. Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Ngừng sử dụng thuốc ngay và báo cho bác sỹ biết.

14. Nhà đăng ký và sản xuất sản phẩm: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng quá liều chỉ định.
- Không dùng thuốc này khi đã biến màu hoặc quá hạn sử dụng.



16 . Phụ nữ có thai và cho con bú:

- **Thời kỳ mang thai:** Không có nguy cơ nào được biết. Khẩu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg thiamin.

- **Thời kỳ cho con bú:** Mẹ dùng thiamin vẫn tiếp tục cho con bú được. Khẩu phần ăn hàng ngày trong thời gian cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp đầy đủ , thì không cần bổ sung thêm thiamin.

17. Khi nào cần tham vấn bác sỹ: Khi có những biểu hiện của tác dụng không muốn, quá liều hay cần biết thêm thông tin, xin hỏi bác sĩ.

18. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

**ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
Đường Hữu Nghị - Tp Đồng Hới- Quảng Bình- Việt Nam
ĐT: (0523) 822475 - 822346 Fax: 0523 820720

mu

Ngày ...5... tháng ...8... năm 2011.

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ds. Nguyễn Thị Mai