


MẪU NHÃN


13/136

1. Nhãn trên vỉ 10 viên.



Số lô SX, HD :
In chìm trên vỉ.

2. Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên.



Đà Nẵng ngày 23 tháng 05 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng theo liều chỉ định của Bác sĩ hoặc liều thường dùng :

** Uống thuốc trước hoặc trong các bữa ăn.*

- Người lớn:

Phòng và điều trị thiếu vitamin nhóm B:

+ Do dinh dưỡng: Uống 1-2 viên/lần/ngày.

+ Do thuốc: Uống mỗi lần 1-2 viên $\times$ 2-3 lần/ngày.

Viêm đa dây thần kinh do nghiện rượu: Uống mỗi lần 2 viên $\times$ 1-2 lần/ngày.

- Trẻ em: Uống bằng $\frac{1}{2}$ liều người lớn

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với cobalamin.

- Người đã biết rõ không dung nạp Vitamin B₁.

- Bệnh lý ác tính hoặc nghi ngờ có khối u.

THẬN TRỌNG:

- Sau thời gian dài dùng vitamin B₆ với liều 200 mg/ngày, có thể thấy biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200 mg vitamin B₆ mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Liều bổ sung theo nhu cầu hằng ngày không gây hại cho thai nhi, nhưng với liều cao có thể gây lệ thuộc thuốc ở trẻ sơ sinh.

- Với người mẹ đang cho con bú, sử dụng thuốc theo nhu cầu hằng ngày không gây ảnh hưởng gì. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp đầy đủ thì không cần phải sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có nguy cơ nào được biết

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

- Rất hiếm khi gây phản ứng dị ứng.

- Dùng liều Vitamin B₆ cao (200 mg/ngày) và kéo dài, có thể gây các biểu hiện thần kinh ngoại biên, kiểu gây dị cảm.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Toàn thân: Phản vệ, sốt

Da: Phản ứng dạng trứng cá, mề đay, ngứa, đỏ da.

Buồn nôn, nôn.

** Hãy báo ngay cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải khi dùng thuốc.*

TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Vitamin B₆ làm giảm tác động của levodopa do kích hoạt enzym dopadecarboxylase ngoại biên.

- Vitamin B₆ có thể làm giảm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.

- Thuốc tránh thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin B₆.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có thông tin.

KHUYẾN CÁO:

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng của thuốc như : viên bị ướt, bị biến màu.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

- Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN :

- Thuốc ép trong vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ; có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Để thuốc nơi khô, mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ 20-30°C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà nẵng

Tel: 0511.3760130

Fax: 0511.3760127

Tư vấn sức khỏe : 0511.3760131

Email: info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh