



**Thành phần:**

Chlorhexidine digluconate ..... 0,2%

Tá dược vừa đủ 1 tuýp 10 g.

**Quy cách đóng gói:**

Hộp 1 tuýp 10 g

**Công dụng:**

Viêm quanh chân răng

Những vết loét cục bộ trong miệng họng do nhiệt miệng, nhiễm khuẩn.

Sát khuẩn trước và sau khi phẫu thuật nha khoa, sát khuẩn trong cấy Implant.

Phòng bệnh viêm lợi.

**Lưu ý:**

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**Hướng dẫn sử dụng:**

Cho gel vào miếng gạc mềm sau đó xoa đều lên nướu răng hoặc có thể cho gel trực tiếp vào vùng nướu răng tổn thương, vùng miệng bị nhiệt.

Dùng 2 lần hoặc 3 lần/ngày.

Nên sử dụng gel sau mỗi bữa ăn và không dùng thức ăn hay nước uống ít nhất 30 phút - 1 giờ sau khi bôi.

Sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ sẽ có hiệu quả cao nhất.

Không được súc miệng sau khi dùng.

**Thận trọng và cảnh báo:**

Trong một số trường hợp có thể làm giảm cảm giác vị giác tuy nhiên hiện tượng này sẽ mất sau khi ngừng sử dụng.

Làm thay đổi màu răng sau khi sử dụng thời gian dài hay sau khi sử dụng thức ăn, đồ uống như: rượu, café, thuốc lá.

Tuy nhiên sự thay đổi này chỉ là tạm thời và có thể hồi phục được.

**Bảo quản:** Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng*

*Để xa tầm tay trẻ em*



**Nhà phân phối:**

**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP**

Ô 54 F3, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

**Tổng đài tư vấn:** 1900.54.5518

**Tư vấn online:** [www.bacsytructuyen.com](http://www.bacsytructuyen.com)



**Sản xuất tại:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**Địa chỉ:** Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành Phố Hà Nội.