



P. Giám Đốc
Trung Tâm Ứng Dụng KHCN ĐY-ĐD



ThS. DS. Nguyễn Văn Bìn

hương sa lục quân

Chai 50g

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC Y DƯỢC
273 - 275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

SKS :
HD :

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Số DK.

• CÔNG DỤNG : Trị dị vị hư hàn, suy nhược cơ thể, ăn uống kém tiêu.

• CHỐNG CHỈ ĐỊNH : Người thực nhũ, ăn thực, ăn thực ăn nhũ, các trường hợp thuốc nhũ nhũ.

• CÁCH DÙNG :
Người lớn : mỗi lần uống 30 giọt.
Trẻ em : 10-12 tuổi mỗi lần uống 15 giọt.
Trẻ em : 12-18 tuổi mỗi lần uống 15 giọt.
Ngày uống 2 lần.

• CÔNG THỨC :

- Gừng sấy.....	6,74g
- Bạch linh.....	6,74g
- Bạch truật.....	6,74g
- Cỏ tranh sấy.....	6,74g
- Trích bì.....	3,37g
- Đản hạ.....	2,69g
- Sủi nhũ.....	1,74g
- Mộc hương.....	1,10g
- Trá dược (mật ong, nước).....	90g

P. Giám Đốc
Trung Tâm Ứng Dụng KHCN ĐY-ĐD



ThS. DS. Nguyễn Thu Ba

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

HƯỚNG SA LỤC QUÂN

Chai 50g Hoàn cứng

Công thức:

- Đảng sâm..... 6,74 g (<i>Radix Codonopsis piosulae</i>)	- Trần bì..... 3,37 g (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)
- Bạch linh..... 6,74 g (<i>Poria</i>)	- Bán hạ chế 2,69 g (<i>Rhizoma Pinelliae Praepatara</i>)
- Bạch truật 6,74 g (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	- Sa nhân 1,74 g (<i>Fructus Amomi</i>)
- Cam thảo bắc..... 6,74 g (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	- Mộc hương 1,10 g (<i>Radix Saussureae lappae</i>)
- Mật ong (<i>Mel</i>) và tá dược (<i>Excipient</i>) vđ..... 50 g	

Lời khuyên cáo: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Chủ trị: Các chứng do tỳ vị hư hàn, ngực bụng đầy tức, ăn uống chậm tiêu, đau bụng, đi tiêu phân sống

Liều dùng và cách dùng: Ngày uống 2 lần

- Người lớn : Mỗi lần uống 30 hoàn
- Trẻ em : Từ 6 – 12 tuổi: Mỗi lần uống 15 hoàn
Từ 12 – 16 tuổi: Mỗi lần uống 20 hoàn

Chống chỉ định: Người thực nhiệt, âm hư, táo bón do nhiệt, các trường hợp thuộc nhiệt chứng.

Tác dụng không mong muốn: hiếm thấy xảy ra táo bón.

Quy cách đóng gói: Lọ 50 g viên hoàn cứng.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát. Để xa tầm tay trẻ em.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý: Không dùng thuốc quá hạn ghi trên bao bì.


Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Sản xuất theo Tiêu Chuẩn Cơ Sở:

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Y ĐÔNG DƯỢC
273 – 275 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Ngày 12 tháng 5 năm 2011

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM




ThS. DS. Nguyễn Thu Ba