

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22-06-2017

HỘP 5 ỨNG X 1 ML

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Keep out of the reach of children
Read carefully the leaflet before use

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

THÀNH PHẦN:

Mỗi ống chứa: Nước cắt pha tiêm.....1ml
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,
CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng

TIÊU CHUẨN: EP 7.0

COMPOSITION:

Each ampoule contains: Water for injection.....1ml

**INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE,
ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION:**

Please see the leaflet insert

STORAGE: Dry place at temperature below 30°C,
protect from light

SPECIFICATION: EP 7.0



Nhà sản xuất:

Công ty TNHH Sản Xuất Dược Phẩm Medlac Pharma Italy
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long,
Huyện Thạch Thất, Hà Nội

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

BB19-1/01

Batch No. / Số lô SX :

Mfg. Date / NSX :

Exp. Date / HD :

SĐK:



Rx Thuốc bán theo đơn

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

HỘP 5 ỨNG X 1 ML

NƯỚC CẮT PHA TIÊM / WATER FOR INJECTION
TIÊM BẮP, TIÊM TĨNH MẠCH, TIÊM DƯỚI DA / FOR I.M., I.V., S.C



NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

MẪU NHÃN ỨNG 1 ML

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

Nước cắt pha tiêm 1 ml

For IM, IV, SC / TB, TTM, TDD

Số lô SX: PR9Bxxxxy HD: ddmmyy

CTY TNHH SX DP Medlac Pharma Italy



MẪU NHÃN ỐNG 2 ML

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

Nước cất pha tiêm 2 ml
For IM, IV, SC / TB, TTM, TDD
Số lô SX: PR2Bxxxxxy HD: ddmmyy
CTY TNHH SX DP Medlac Pharma Italy

HỘP 5 ỐNG X 4 ML



MẪU NHÃN ỐNG 4 ML

NƯỚC CẮT PHA TIÊM MEDLAC

Nước cất pha tiêm 4 ml
For IM, IV, SC / TB, TTM, TDD
Số lô SX: PR4Bxxxxxy HD: ddmmyy
CTY TNHH SX DP Medlac Pharma Italy

HỘP 5 ỨNG X 5 ML



MẪU NHÃN ỨNG 5 ML

**NƯỚC CẮT PHA TIÊM
MEDLAC**

Nước cất pha tiêm 5 ml
For IM, IV, SC / TB, TTM, TDD
Số lô SX: PR5Bxxxxy HD: ddmmyy
CTY TNHH SX DP Medlac Pharma Italy

HỘP 5 ỐNG X 10 ML



MẪU NHÃN ỐNG 10 ML


**NƯỚC CẮT PHA TIÊM
MEDLAC**

Nước cất pha tiêm 10 ml
For IM, IV, SC / TB, TTM, TDD
Số lô SX: **PR1Bxxxxyy** HD: **ddmmyy**
CTY TNHH SX DP Medlac Pharma Italy

HỘP 1 LỌ 20 ML




MẪU NHÃN LỌ 20 ML



HỘP 1 LỌ 50 ML



MẪU NHÃN LỌ 50 ML





Hướng dẫn sử dụng Nước cất pha tiêm Medlac



KHUYẾN CÁO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đề xa tầm tay của trẻ em

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ

Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Muốn biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.

CÔNG THỨC

Ống chứa 1ml; 2ml; 4ml; 5ml; 10ml nước cất pha tiêm;

Lọ chứa 20ml; 50ml nước cất pha tiêm.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Dung dịch trong suốt, không màu được đóng trong lọ hoặc ống kín.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 5 ống x 1ml; Hộp 5 ống x 2ml; Hộp 5 ống x 4ml; Hộp 5 ống x 5ml;

Hộp 5 ống x 10ml; Hộp 1 lọ x 20ml; Hộp 1 lọ x 50ml.

DƯỢC LỰC HỌC

Nước vô khuẩn pha tiêm là dung môi, chất pha loãng, các đặc tính dược lực học phụ thuộc vào bản chất của thuốc được hòa tan hay pha loãng trong nước cất pha tiêm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nước vô khuẩn pha tiêm là dung môi, chất pha loãng, các đặc tính dược động học phụ thuộc vào bản chất của thuốc được hòa tan hay pha loãng trong nước cất pha tiêm.

CHỈ ĐỊNH

Nước vô khuẩn pha tiêm dùng để hòa tan các thuốc tiêm bột hoặc pha loãng các chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng.

CÁCH DÙNG

- Tùy theo yêu cầu sử dụng của thầy thuốc;
- Sử dụng để pha thuốc theo đơn thuốc đối với các loại thuốc bột pha tiêm hoặc dung dịch thuốc tiêm đậm đặc cần pha loãng trước khi dùng. Liều dùng phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo các thuốc tiêm.

- Khi hòa tan hoặc pha loãng thuốc với nước cất pha tiêm, phải sử dụng kỹ thuật vô khuẩn. Phần nước vô khuẩn pha tiêm không sử dụng phải hủy bỏ. Không lưu trữ dung dịch thuốc đã pha quá hạn dùng của dung dịch sau khi pha.
- Nên kiểm tra kỹ độ trong hoặc sự đổi màu của chế phẩm thuốc tiêm bằng mắt thường trước khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nước vô khuẩn pha tiêm là dung dịch nhược trương, vì vậy nó gây tan máu. Chống chỉ định dùng nước vô khuẩn để tiêm mà không pha với các chế phẩm khác.

TÁC DỤNG PHỤ

- Sử dụng hỗn hợp pha theo đơn có thể kèm theo tác dụng phụ do bản chất của dung dịch thuốc hoặc do kỹ thuật tiêm. Các phản ứng này bao gồm sốt, nhiễm khuẩn tại vị trí tiêm, huyết khối tĩnh mạch hoặc viêm phù mạch tại vị trí tiêm, thoát mạch hoặc tăng thể tích máu lưu thông.
- Thầy thuốc cũng nên cảnh giác với các tác dụng phụ của các thuốc thêm vào có thể xảy ra. Cần tham khảo thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc khi pha với nước cất. Nếu tác dụng phụ khi dùng dung dịch đã pha xảy ra, cần phải ngừng tiêm truyền, đánh giá tình trạng bệnh nhân và áp dụng các biện pháp trị liệu thích hợp.

THẬN TRỌNG

- Chỉ dùng tiêm tĩnh mạch khi đã được đăng tương hóa với các chất thích hợp.
- Không được dùng khi chai bị hở nút, chảy rỉ, có cặn.

NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Những ảnh hưởng trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú được xác định bởi bản chất của các thuốc được hòa tan hoặc pha loãng trong nước cất pha tiêm.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Những ảnh hưởng tới khả năng lái xe hay vận hành máy móc là do bản chất của các thuốc được hòa tan hoặc pha loãng trong nước cất pha tiêm.

TƯƠNG TÁC THUỐC, TƯƠNG Kỵ

Các tương tác xảy ra là do bản chất của các thuốc được hòa tan hoặc pha loãng trong nước cất pha tiêm.

Một số chất thêm vào có thể gây tương kỵ. Không pha với các chất tương kỵ được biết trước. Tham khảo ý kiến dược sỹ trước khi sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Dấu hiệu và triệu chứng của quá liều liên quan tới thuốc được hòa tan hay pha loãng trong nước cất pha tiêm. Trong trường hợp quá liều, nên ngưng điều trị, theo dõi và có biện pháp xử trí thích hợp các triệu chứng do các thuốc tiêm đã sử dụng.

BẢO QUẢN



Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN SỬ DỤNG: 5 năm kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN: EP7.0

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MEDLAC PHARMA ITALY

Khu công nghiệp công nghệ cao I, Khu công nghệ cao Hoà Lạc,
KM29, Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Tel: 0433594104

Fax: 0433594105

Ngày cập nhật hướng dẫn sử dụng:



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

