

HYDRITE COCONUT TABLETS
Hộp 25 vỉ x 4 viên



Hydrite®

coconut Tablet

VIÊN NÉN HƯƠNG DỪA

CÔNG THỨC THEO KHUYẾN CÁO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI TRONG
TIÊU CHẢY - NÓN ỚI - SỐT - LUYỆN TẬP THỂ THAO



HƯƠNG DỪA

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

THÀNH PHẦN

Mỗi viên chứa:
Natri Clorid 520 mg
Trinatri Citrat Dihydrat (Natri Citrat Dihydrat) 580 mg
Kali Clorid 300 mg
Dextrose khan 2700 mg

CHỈ ĐỊNH

- Dùng để bù nước và chất điện giải mất trong các bệnh tiêu chảy cấp, nôn mửa, sốt cao, hay tiêu hao do biến dưỡng như khi luyện tập nặng nhọc và chơi thể thao.
- Dùng trong điều trị mất nước do tiêu chảy ở trẻ em và người lớn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

I. MẤT NƯỚC DO TIÊU CHẢY

Hướng dẫn: Pha 1 viên vào 1 ly 200 ml nước đun sôi để nguội.

II. MẤT NƯỚC KHÔNG DO TIÊU CHẢY

Uống dung dịch Hydrite® từng ngụm theo khả năng trong các trường hợp sau:
Uống Trẻ sốt cao, sốt xuất huyết (độ I, II, III nếu bé uống được), kém ăn uống trong lúc bị bệnh, nôn ói, bồng.
Để đề phòng mất nước và điện giải trong khi hoạt động thể lực (như vận động viên, viên, những người làm việc lâu trong môi trường nắng nóng...).

Liều lượng và cách sử dụng, chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK/Reg.No:

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
WHO-GMP, GLP, GSP
Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II,
Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Đức Một Tân Bình Đông, Việt Nam.
ĐT: 38 39621000
©Đăng ký nhãn hiệu: Westmont Pharmaceuticals, Inc.

Số lô SX/ Lot #:
 NSX/ Mfg.
 HD/ Exp.

HƯƠNG DỪA



CÔNG THỨC THEO KHUYẾN CÁO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI TRONG
TIÊU CHÁY - NÔN ÓI - SỐT - LUYỆN TẬP THỂ THAO

VIÊN NÉN HƯƠNG DỪA

Hydrite®
Coconut Tablet

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén



Box of 25 strips x 4 tablets



Hydrite®
Coconut Tablet

THE FORMULA RECOMMENDED BY WHO
**REPLENISH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO
DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES**



COCONUT FLAVOR

Manufactured by
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD.
WHO-GMP, GLP, GSP
No.16 VSIP II, Street No.7, Vietnam-Singapore II Industrial Park,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: 08-39621000
©Registered trademark of Westmont Pharmaceuticals, Inc.

COMPOSITION

Each tablet contains:

Sodium Chloride 520 mg
Triiodium Citrate Dihydrate 580 mg
Potassium Chloride 300 mg
Dextrose Anhydrous 2700 mg

INDICATIONS

This medicine replenishes fluid and electrolytes lost due to acute diarrhea, vomiting, fever and increased metabolic expenditure as in vigorous exercises and athletics.

- This medicine is used in the treatment of children and adults with dehydration due to diarrhea.

DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE
I. DEHYDRATION DUE TO DIARRHEA

ORAL REHYDRATION

Directly: Dissolve the contents of one tablet in one glass (200 ml) of clean drinking water.

II. DEHYDRATION NOT DUE TO DIARRHEA

Give frequent sips of Hydrite® solution as much as the patient wants

High fever, dengue fever (I, II, III grade if oral route is possible), anorexia and vomiting, burn patients.

- To prevent dehydration during physical activity (athlete, person who works long hours in hot environments-).

Dosage and instruction for use, contraindications and others information, please refer to the package insert

Store in a dry place, at temperatures not exceeding 30°C, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

Barcode

HYDRITE COCONUT TABLET – Viên nén

Hộp 1 vỉ x 2 viên

Box of 1 strip x 2 tablets: 65 x 15 x 110 mm



UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO
UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO., LTD. Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> REFLESH FLUID AND ELECTROLYTES LOST DUE TO: DIARRHEA - VOMITING - FEVER - PHYSICAL ACTIVITIES	CTY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Hydrite® <i>Cocconut Tablet</i> VIỆN SÜN THÜNG DÜA BÜ NÜC VÄ DIÊN GIÄ TRÜNG: TIÊU CHÄY - NÖN ÖI - SÖT - LUYÊN TÄP THÉ THÄO

LFVIEV115000FL-01



Back foil size: 106 mm
Strip cut: 106 x 106 mm

Hydrite® Coconut Tablet

VIÊN NÉN HƯƠNG DỪA

CÔNG THỨC THEO KHUYẾN CÁO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI TRONG: TIÊU CHẢY – NÓN ÓI – SỐT – LUYỆN TẬP THỂ THAO

THÀNH PHẦN

Mỗi viên chứa:
Natri Clorid.....520 mg
Trinatri Citrat Dihydrat (Natri Citrat Dihydrat)580 mg
Kali Clorid.....300 mg
Dextrose khan.....2700 mg

Tương đương với:

Natri (dạng Natri Clorid & Trinatri Citrat Dihydrat) ...340.0 mg
Kali (dạng Kali Clorid).....157.0 mg
Clorid (dạng Natri Clorid & Kali Clorid).....458.5 mg
Citrat (dạng Trinatri Citrat Dihydrat)373.0 mg
Dextrose khan.....2700 mg

Tá dược: Saccharin Sodium, Povidone K-30, Polyethylene Glycol 6000, Croscarmellose Sodium, Hương Dừa, Cồn.

Nồng độ điện giải tương đương trong:

1 viên Hydrite® Coconut Tablet/ 200 ml	Khuyến cáo mới nhất của WHO/ UNICEF
Natri 75 mmol/l	75 mmol/l
Kali 20 mmol/l	20 mmol/l
Clorid 65 mmol/l	65 mmol/l
Citrat 10 mmol/l	10 mmol/l
Glucose 75 mmol/l	75 mmol/l

Công thức trên phù hợp với khuyến cáo mới nhất của WHO (Tổ chức y tế thế giới) và UNICEF (Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc) về dung dịch bù nước bằng đường uống.

CHỈ ĐỊNH

Dùng để bù nước và chất điện giải mất trong các bệnh tiêu chảy cấp, nôn mửa, sốt cao, hay tiêu hao do biến dưỡng như khi luyện tập nặng nhọc và chơi thể thao.

Dùng trong điều trị mất nước do tiêu chảy ở trẻ em và người lớn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

I. MẤT NƯỚC DO TIÊU CHẢY

A. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ MẤT NƯỚC

1. Các dấu hiệu lâm sàng			
a) Nhìn			
Tổng trạng	Khoẻ, tỉnh táo	<u>Vết vã, kích thích</u>	<u>Hôn mê hay ngủ lịm</u>
Mắt	Bình thường	Trùng	Rất trùng và khô
Nước mắt	Có	Không có	Không có
Miệng và lưỡi	Ấm ướt	Khô	Rất khô
Khát nước	Không khát, uống bình thường	<u>Khát, uống háo hức</u>	<u>Uống kém hoặc không uống được</u>
b) Sờ			
Nếp véo da	Trở lại bình thường nhanh	<u>Trở lại bình thường chậm</u>	<u>Trở lại bình thường rất chậm (> 2 giây)</u>
2. Kết luận	Bệnh nhân không có dấu hiệu mất nước	Nếu bệnh nhân có 2 dấu hiệu trở lên, trong đó có ít nhất 1 dấu hiệu có gạch dưới, xếp loại có mất nước	Nếu bệnh nhân có 2 dấu hiệu trở lên, trong đó có ít nhất 1 dấu hiệu có gạch dưới, xếp loại mất nước nặng
3. Phác đồ điều trị	Dùng Hydrite® Coconut Tablet để phòng ngừa mất nước theo phác đồ điều trị A (có thể điều trị tại nhà)	Dùng Hydrite® Coconut Tablet để điều trị mất nước theo Phác đồ điều trị B (hỏi ý kiến bác sĩ)	Bệnh nhân cần nhập viện ngay để nhanh chóng bù nước qua đường tĩnh mạch theo Phác đồ điều trị C

B. UỐNG BÙ NƯỚC

Hướng dẫn: Pha 1 viên vào 1 ly 200 ml nước đun sôi để nguội.

• PHÒNG NGỪA MẤT NƯỚC (PHÁC ĐỒ A)

Cho bệnh nhân uống dung dịch Hydrite® Coconut Tablet càng nhiều càng tốt theo khả năng cho đến khi ngừng tiêu chảy. Liều trung bình 10 ml/kg, nhân trọng lượng bệnh nhân (kg) với 10 ml để được thể tích trung bình (ml) của dung dịch Hydrite® Coconut Tablet cần bù sau mỗi lần đi tiêu phân lỏng.

Cho thêm các loại dịch khác chẳng hạn như nước đun sôi để nguội, nước cơm, canh rau, súp thịt gà, nước dừa tươi, yaourt (sữa chua), nước ép trái cây (không thêm đường).

TIẾP TỤC ĂN NẾU DUNG NẠP TỐT. TIẾP TỤC CHO BÚ.

• ĐIỀU TRỊ MẤT NƯỚC (PHÁC ĐỒ B)

(Bù mất nước từ nhẹ đến vừa)

Liều trung bình 75 ml/kg, nhân trọng lượng bệnh nhân (kg) với 75 ml để được thể tích trung bình (ml) của dung dịch Hydrite® Coconut Tablet cần cho trong 4 giờ đầu.

Tiếp tục cho bú ngay cả trong lúc thực hiện biện pháp bù nước.

Sau 4 giờ, đánh giá lại bệnh nhân dựa trên bảng đánh giá mức độ mất nước và chọn phác đồ điều trị thích hợp.

- Nếu không còn dấu hiệu mất nước, chuyển sang Phác Đồ A.
- Nếu còn các dấu hiệu mất nước, lặp lại Phác Đồ B và tiếp tục đánh giá lại bệnh nhân thường xuyên.
- Nếu xuất hiện các dấu hiệu mất nước nặng, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay để khẩn cấp bù nước qua đường tĩnh mạch (Phác Đồ C).

Tuy nhiên, trường hợp bất thường này hiếm gặp, chỉ xảy ra khi bệnh nhân không uống được hoặc uống rất ít dung dịch Hydrite® Coconut Tablet đồng thời tiêu chảy nhiều và liên tục.

Sau khi hoàn tất quá trình bù nước, nếp véo da sẽ trở lại bình thường, bệnh nhân bớt khát nước, đi tiểu được và không bị kích thích vật vã nữa.

TIẾP TỤC CHO ĂN, CHO BÚ NHƯ BÌNH THƯỜNG (NẾU DUNG NẠP TỐT) SAU 4 GIỜ ĐẦU BÙ NƯỚC.

II. MẤT NƯỚC KHÔNG DO TIÊU CHẢY

Uống dung dịch Hydrite® Coconut Tablet từng ngụm theo khả năng trong các trường hợp sau:

- Trẻ sốt cao, sốt xuất huyết (độ I, II, III nếu bé uống được), kém ăn uống trong lúc bị bệnh, nôn ói, bồng.
- Để đề phòng mất nước và điện giải trong khi hoạt động thể lực (như vận động viên, những người làm việc lâu trong môi trường nắng nóng...).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm hoặc nếu bạn rối loạn dung nạp glucose.
- Suy thận cấp.
- Tắc ruột, liệt ruột, thủng ruột.

THẬN TRỌNG

1. Cần tuân theo đúng cách pha và lượng dung dịch cho uống như đã đề nghị tuy theo cân nặng và/hoặc lứa tuổi bệnh nhân và mục đích sử dụng (phòng ngừa hoặc điều trị mất nước) để tránh thấp liểu hay quá liểu.
2. Pha viên Hydrite® Coconut Tablet ngay trước khi dùng. Nếu không để tủ lạnh, 1 giờ sau khi pha, dung dịch còn thừa nên đổ bỏ. Nếu để tủ lạnh, dung dịch Hydrite® Coconut Tablet pha xong có thể được giữ để uống trong 24 giờ, sau đó thì không nên dùng nữa.
3. Dùng nước nguội để pha viên Hydrite® Coconut Tablet. Sau khi pha không bao giờ đun sôi dung dịch Hydrite® Coconut Tablet.

TÁC DỤNG PHỤ

Không có tác dụng phụ nếu theo đúng cách pha, thể tích nước pha và cho uống dung dịch đúng liều lượng. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng quá liều bao gồm tăng natri huyết (hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, tăng huyết áp, cáu gắt, sốt cao...) khi uống dung dịch Hydrite® Coconut Tablet đậm đặc và triệu chứng thừa nước (mi mắt húp nặng, phù toàn thân, suy tim).

Điều trị tăng natri huyết: truyền tĩnh mạch chậm dung dịch nhược trương và cho uống nước.

Điều trị thừa nước: ngừng cho uống dung dịch Hydrite® Coconut Tablet và dùng thuốc lợi tiểu nếu cần.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Thuốc này không tương tác với thức ăn hoặc thuốc khác. Nên báo cho bác sĩ biết các thuốc bạn đang dùng.

TRÌNH BÀY

Hộp 25 vỉ x 4 viên. Hộp 1 vỉ x 2 viên.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DỤNG

4 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
WHO-GMP, GLP, GSP

Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II,
Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 08-39621000

®Đăng ký nhãn hiệu: Westmont Pharmaceuticals, Inc.

TU CỤC TRI ỜNG
TRƯỜNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy