

# MẪU HỘP GIẤY 1 TUÝP 5G



# MẪU TUÝP NHÔM 5G



\* Ghi chú: Số lô sản xuất và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp

### MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tờ hướng dẫn sử dụng

## HYDROCORTISON

Thuốc mỡ tra mắt

**CÔNG THỨC:** Mỗi tuýp thuốc 5 gam có chứa

Hydrocortison acetat..... 50 mg

Tá dược: Parafin rắn, vaselin, Alcol cetylic vừa đủ..... 5 gam

**CHỈ ĐỊNH:** Được dùng để điều trị viêm kết mạc dị ứng như viêm kết mạc mùa xuân.

**CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:**

Sau khi rửa sạch mắt, tra một lượng nhỏ thuốc vào phần kết mạc, trung bình 2 - 3 lần / ngày. Nếu bệnh không cải thiện trong vòng vài ngày thì nên ngừng điều trị.

Thời gian điều trị tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và có thể dùng thuốc từ vài ngày đến vài tuần, cần phải tránh điều trị lâu dài. Liều lượng nên giảm dần dần để tránh nguy cơ làm bệnh trầm trọng hơn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc
- Người bệnh nhiễm khuẩn (đặc biệt trong lao tiến triển), nhiễm virus (thủy đậu, zona, herpes giác mạc), nhiễm nấm bệnh hay kí sinh trùng chỉ được dùng glucocorticoid sau khi đã được điều trị bằng các thuốc chống nhiễm các bệnh kể trên.

**THẬN TRỌNG:**

- Thận trọng trong điều trị đối với bệnh nhân có tiền sử viêm giác mạc do Herpes.
- Có nguy cơ thủy giác mạc nếu có viêm loét giác mạc và nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, nấm, virus khi dùng kéo dài.
- Có nguy cơ phát triển glôcôm góc mở và đục thủy tinh thể.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON CON BÚ:**

Chưa có tài liệu chứng minh được tính an toàn của việc sử dụng corticoid dùng ngoài với liều cao hoặc sử dụng với thời gian dài trên phụ nữ có thai. Nếu dùng phải có chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Dùng đồng thời với các thuốc bacbiturat, carbamazepin, phenytoin, rifampicin thì corticoid bị tăng chuyển hóa và giảm tác dụng.

Dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu thì làm giảm Kali

Dùng đồng thời với các thuốc chống viêm không steroid sẽ làm tăng tỷ lệ chảy máu và loét dạ dày tá tràng

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Tăng áp lực nội nhãn với tổn thương thần kinh thị giác, giảm thị lực. Đục thủy tinh thể dưới bao sau khi sử dụng corticoid dùng ngoài với liều cao hoặc kéo dài. Nhiễm trùng mắt thứ phát do nấm hay virus.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC, ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:**

**\*Được lực học:**

Hydrocortison là corticoid tiết từ vỏ thượng thận, thuộc nhóm glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, chống ngứa và ức chế miễn dịch

**\*Được động học:**

Hydrocortison cũng hấp thu tốt qua da, đặc biệt khi da bị tổn thương.

Sau khi hấp thu, hydrocortison chuyển hóa ở gan và ở hầu hết các mô trong cơ thể thành dạng hydro hóa và giáng hóa như tetrahydrocortison và tetrahydrocortisol. Các chất này được bài tiết qua nước tiểu, chủ yếu dưới dạng liên hợp glucuronic và một lượng nhỏ dưới dạng không biến đổi.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Các tác dụng ngoại ý trên toàn thân có thể xuất hiện khi dùng liều quá cao corticoid

Đục thủy tinh thể dưới bao sau khi sử dụng corticoid dùng ngoài với liều cao hoặc kéo dài.

**LỖI KHUYẾN CÁO:**

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Đề xa tầm tay trẻ em.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Tuýp 5 gam, hộp 1 tuýp

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc



**CTCP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD**

8 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Huế - Việt Nam

MEDIPHARCO ĐT: 054. 3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077

Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2011  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phạm Thị Bình