

Idarac[®] 200 mg

Floctafenin

Viên nén



Sản xuất nhượng quyền của **AVENTIS PHARMA S.A.**

THÀNH PHẦN

Floctafenin200 mg

Tá dược: tinh bột ngô, natri docusat, povidon K30, magesi stearat vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén. Hộp 2 vỉ x 10 viên.

DƯỢC LỰC HỌC

Thuốc có tác dụng giảm đau đơn thuần không hạ sốt và kháng viêm, thuộc nhóm nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Thuốc được hấp thu nhanh qua đường uống. Nồng độ thuốc trong huyết tương đạt mức tối đa 1 giờ đến 2 giờ sau khi uống thuốc. Thời gian bán hủy khoảng 8 giờ.

Trong gan, phần lớn floctafenin được chuyển hóa thành acid floctafenic.

Floctafenin và các chất chuyển hóa của nó được thải trừ 60% qua đường mật và 40% qua đường tiểu dưới dạng liên hợp glucuronid.

Floctafenin qua được nhau thai và vào sữa mẹ.

CHỈ ĐỊNH

Idarac được chỉ định điều trị các chứng đau mức độ nhẹ đến trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Idarac KHÔNG ĐƯỢC DÙNG trong những trường hợp sau:

- Dị ứng với floctafenin hoặc các chất tương tự (glafenin, antrafenin).
- Phối hợp với các thuốc chẹn beta.
- Suy tim nặng.
- Bệnh tim thiếu máu cục bộ (một số bệnh tim với lượng máu đến nuôi tim giảm).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ dùng cho người lớn.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo loại đau, từ 200 mg đến 400 mg/lần, các liều cách nhau 6 đến 8 giờ.

Trung bình 800 mg một ngày, tối đa 1,2 g một ngày.

Uống với 1 ly nước.

Thuốc có thể được uống nguyên viên, hoặc tốt hơn, hòa tan trước trong nước.

Luôn luôn theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

THẬN TRỌNG

- Tránh dùng lặp đi lặp lại các liều đơn độc.
- Báo cho bác sĩ biết nếu có bệnh thận.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Báo cho bác sĩ biết nếu có bệnh tật.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Tốt hơn không dùng thuốc này khi có thai. Idarac không được chỉ định dùng ở phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.

NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG BẤT CỨ LOẠI THUỐC NÀO NGƯỜI LÁI XE HOẶC SỬ DỤNG MÁY MÓC

Lưu ý những người lái xe và sử dụng máy móc về nguy cơ buồn ngủ khi dùng thuốc này.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Tất cả các thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng đều phải báo cho bác sĩ, đặc biệt là: các thuốc giảm đau kháng viêm không steroid khác, *warfarin*, thuốc lợi tiểu, thuốc tiểu đường, thuốc trị cao huyết áp, thuốc chống đông, *lithium*, *methotrexat*, *phenytoin*,.....

ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XẢY RA, PHẢI LUÔN LUÔN BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tai biến dạng dị ứng. Các tai biến này hiếm nhưng nghiêm trọng và người bệnh không được dùng thuốc này và các thuốc tương tự:

- Mê đay, phù mạch thần kinh (sưng thanh môn và thanh quản),
- Tai biến dị ứng xảy ra trung bình 30 phút sau khi dùng thuốc, với cảm giác kim châm và nóng bỏng ở bàn tay, bàn chân và mặt, đột ngột đỏ ửng ở mặt hoặc phần ngực trên, ngứa thanh quản, phát ban ở da hoặc sưng mí mắt, hồng ban toàn thân (đỏ ửng) với ngứa, cảm giác khó chịu toàn thân và có thể tiến triển đến mức mất tri giác,
- Khó thở dạng suyễn,
- Bệnh thận cấp với lượng nước tiểu giảm.

Những rối loạn này có thể xảy ra ở người đã trở nên nhạy cảm với thuốc do lần dùng trước; phải ngưng dùng thuốc ngay, không được dùng lại thuốc và báo bác sĩ.

Rất hiếm gặp những trường hợp:

- Buồn nôn và nôn,
- Buồn ngủ,
- Cảm giác nóng rát khi tiểu.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC NÀY

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Trường hợp quá liều hoặc ngộ độc thuốc cần báo ngay bác sĩ, để có biện pháp xử lý thích hợp.

BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất theo TCCS,

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Sản xuất nhượng quyền của: **AVENTIS PHARMA S.A.** 20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France

tại Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM**

Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

76534-B