



GEL BÔI DA

ISOTRIN 0,05%

Isotretinoin 0,05% (kl/kl)



GIẢM TIẾT BÃ NHỜN,
làm sáng da, giảm thâm



GIẢM SÙNG HÓA
cổ nang lông, giảm mụn



CHỐNG VIÊM,
giảm mụn viêm đỏ



Điều trị mụn trứng cá
CÓ VÀ KHÔNG CÓ VIÊM

Số đăng ký: VD-35839-22

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GEL BÔI DA

ISOTRIN 0,05%

Isotretinoin 0,05% (kl/kl)



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 01 tuýp thuốc 15 g

THÀNH PHẦN, HẠM LƯỢNG

1 g Gel bôi da có chứa:

Isotretinoin.....0,5 mg

Tá dược vừa đủ.....1,0 g

(Hydroxypropyl cellulose, Butyl hydroxytoluen, Ethanol)

CHỈ ĐỊNH

Gel bôi da Isotrin 0,05% được sử dụng để điều trị các tình trạng mụn trứng cá (có và không có viêm) từ nhẹ đến vừa.

CÁCH DÙNG

Isotrin 0,05% chỉ được sử dụng ngoài da.

- » Rửa sạch tay trước khi dùng thuốc.
- » Loại bỏ toàn bộ lớp trang điểm bằng các phương pháp tẩy trang an toàn.
- » Dùng tay xoa một lớp gel mỏng lên vùng da có mụn và vùng da xung quanh.
- » Rửa lại tay sau khi dùng thuốc.

LIỀU DÙNG

Với người lớn và thanh thiếu niên:

- » Thông thường, thuốc được sử dụng 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.
- » Nếu xuất hiện các kích ứng (đỏ da, bong da hoặc khô chiu) sau khi sử dụng, có thể giảm liều hoặc tần số sử dụng hoặc ngừng thuốc đến khi hết kích ứng và bắt đầu lại. Nếu các kích ứng tiếp tục xuất hiện, cần ngừng thuốc.
- » Thời gian sử dụng khoảng 6 - 8 tuần để đạt được hiệu quả điều trị.

Sử dụng cho trẻ em:

Hiệu quả và an toàn của thuốc chưa được chứng minh với trẻ trước tuổi dậy thì. Vì vậy không chỉ định thuốc cho đối tượng này.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- » Các trường hợp mẫn cảm với Isotretinoin và bất cứ thành phần nào của thuốc.
- » Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú hoặc người đang nghi ngờ có thai.

THẬN TRỌNG

Thuốc dùng ngoài da, không bôi lên mắt, miệng và các niêm mạc. Nên rửa sạch tay sau mỗi lần sử dụng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- » Không sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp trong thời gian dùng thuốc.
- » Cán ngưng sử dụng thuốc ít nhất 1 chu kỳ kinh nguyệt trước khi muốn mang thai.

Ảnh hưởng thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không có ảnh hưởng của việc dùng thuốc đến khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

- » Hiệu quả của Isotretinoin bị giảm khi sử dụng kèm các chất oxy hóa, như Benzoyl peroxide. Nếu cần phải dùng cả hai, nên sử dụng vào những khoảng thời gian khác nhau (một vào buổi sáng và một vào buổi tối).
- » Sử dụng đồng thời Isotretinoin với chế phẩm bôi da khác có thể làm cho kích ứng da trở lên tối tệ hơn. Nếu da trở lên khó chịu hơn, cần giảm liều hoặc tần số sử dụng thuốc hoặc ngưng một thời gian để phục hồi trước khi tiếp tục điều trị. Ngưng điều trị nếu các kích ứng không cải thiện.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Với da và cấu trúc dưới da:

- » Rất phổ biến (1/10 < ADR): Kích ứng tại chỗ bôi thuốc: Đỏ da, bong da, đau, ngứa, nóng, khô da, kích ứng hoặc dị ứng da.
- » Không xác định tần số: Thay đổi sắc tố da, tăng nhạy cảm với ánh sáng.

BẢO QUẢN

Thuốc được bảo quản trong tuýp nhôm, nắp kín, để nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì
Không dùng sản phẩm khi đã hết hạn, biến màu



Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP**

Thạch Lỗi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội
0923.655.655 | 024.35813670

Miền Bắc: 0923.655.655
Miền Nam: 0845.655.655