

Rx Thuốc bán theo đơn

Hướng dẫn sử dụng

JASUNNY

GMP - WHO

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi gam Jasunny chứa:

Ketoconazole..... 15 mg

Clobetasol propionate.....0,25 mg

Tá dược: Natri lauryl sulfat, natri carboxymethylcellulose, glycerin, acid citric monohydrat, polysorbat 80, cetyl alcol, parafin lỏng, menthol, vanilin, ponceau 4R, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ.

■ **DẠNG BÀO CHẾ:** Nhũ tương dùng ngoài.

■ **DƯỢC LỰC HỌC**

- Ketoconazol: ức chế hoạt tính của cytochrom P450 dẫn đến lượng ergosteron- sterol chính của màng tế bào nấm bị giảm, làm thay đổi tính thấm và chức năng của màng tế bào nấm.

- Clobetasol propionat: gây cảm ứng các lipocortin có tác dụng ức chế phosphorylase A2. Các protein này kiểm soát sự sinh tổng hợp các chất trung gian gây viêm mạnh. Clobetasol propionat có tác dụng chống viêm, chống ngứa và co mạch.

■ **DƯỢC ĐỘNG HỌC**

- Ketoconazol: Sự hấp thu qua da của Ketoconazole trong Jasunny không đáng kể, do đó không tạo ra được một nồng độ có thể phát hiện ở máu.

- Clobetasol propionat: có thể hấp thu một lượng nhất định qua da. Khi clobetasol propionat hấp thu được qua da, clobetasol propionat sẽ chuyển hóa ở gan, thải trừ qua thận và một phần qua mật, rồi theo phân ra ngoài.

■ **CHỈ ĐỊNH:**

Điều trị chứng gàu, ngứa trên da đầu, viêm da tiết bã nhờn do các loài Pityrosporum. Thuốc làm giảm nhanh các triệu chứng của tróc vảy da ở đầu và ngứa da đầu do các tác nhân trên.

■ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Lấy khoảng 5 gam Jasunny bôi lên tóc ẩm, xoa nhẹ trong 3 – 5 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước.

- Điều trị gàu, viêm da đầu: dùng 2 lần/tuần liên tục trong 2 – 4 tuần.

- Dự phòng: dùng 1 lần/tuần hoặc 1 lần/2 tuần.

Dùng cho người từ 12 tuổi trở lên.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Bệnh nhân dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Không dùng điều trị bệnh trứng cá và trứng cá đỏ, viêm da quanh miệng, nhiễm virus trên da, không được dùng bôi ở mắt, nách, háng hoặc dùng trong âm đạo.

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Một số ít bệnh nhân cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng Jasunny. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ **THẬN TRỌNG**

- Chỉ dùng ngoài da, không được băng bịt kín, trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ. Khi băng kín, phải định kì đánh giá tình trạng của trục hạ đồi – tuyến yên – thượng thận bằng các phép thử đặc hiệu.

- Tránh tiếp xúc với mắt.

■ **SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Chưa có nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú.

■ **TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa ghi nhận trường hợp tương tác với thuốc nào khác.

■ **QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ**

Jasunny rất ít độc tính cấp.

Xử trí: Ngừng thuốc và thông báo cho bác sĩ nếu có bất kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.

■ **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 tuýp 50 g, hộp 50 gói 5 g, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

■ **HẠN DÙNG:** 24 tháng.

■ **TIÊU CHUẨN:** TCCS.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ**



Sản xuất tại: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN**

Địa chỉ : Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.699285 * Số fax: 02413.699286

E- mail: gianguyenpharma@gmail.com

Website: www.gianguyenpharma.com