



Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg

Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg

Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg

Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg

Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg

Jeloton Tab. Jeloton Tab. Jeloton Tab.  
Ginkgo biloba 40mg Newgene pharm. Inc. Ginkgo biloba 40mg



100% CHÍNH HÃNG

Handwritten mark

Ginkgo biloba extract

## JELOTON TABLET 40mg

### THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Ginkgo biloba extract .....40 mg

*Tá dược:* Lactose, Corn Starch, Microcrystalline Cellulose, Povidone, Hydroxypropylcellulose, Carboxymethylcellulose Calcium, Sodium starch glycolate, Magnesium Stearate, Acacia, Gelatin, Hydroxypropylmethylcellulose 2910, Titanium Oxide, Carnauba wax, Sunset Yellow, Brilliant Blue, Allura Red.

**MÔ TẢ:** Viên nén bao phim tròn, màu nâu.

### CHỈ ĐỊNH

- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại vi: Chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, suy vớng mạc, bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới mãn tính, đi khập khiễng cách hồi.
- Rối loạn chức năng não kèm theo các triệu chứng suy giảm trí tuệ (ù tai, đau đầu, giảm trí nhớ, mất tập trung, chóng u uất, chóng mặt)

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

**Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên**

- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên như chóng mặt, ù tai: Uống 1 viên x 3 lần/ ngày hoặc 2 viên x 2 lần/ ngày.
- Rối loạn chức năng não: Uống 1 – 2 viên x 3 lần/ ngày hoặc 3 viên x 2 lần/ ngày.

Liều lượng có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi tác và tình trạng bệnh


### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với thuốc
- Phụ nữ có thai, người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu, người thần kinh phân lập, trẻ em thiếu năng trí tuệ, pha nhồi máu cấp.
- Không chỉ định thuốc cho những bệnh nhân tăng huyết áp cần điều trị đặc biệt vì đây không phải là thuốc điều trị tăng huyết áp.

### TÁC DỤNG PHỤ

Có thể xảy ra rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da tuy hiếm

<https://trungtamthuoc.com/>



Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc

**PHỤ NỮ CÓ THAI:** Mặc dù không có bằng chứng thuốc gây nên quái thai trên các nghiên cứu ở động vật. Chưa có nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát tốt trên phụ nữ có thai.

**SỬ DỤNG CHO TRẺ EM:** Độ an toàn khi sử dụng thuốc cho trẻ nhỏ là chưa được chứng minh, không nên sử dụng thuốc cho trẻ dưới 12 tuổi.

### ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Cần lưu ý khi sử dụng Ginkgo biloba trên bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông hoặc các thuốc khác có ảnh hưởng đến sự kết tập tiểu cầu.

Không phối hợp với thuốc chống đông, thuốc cầm máu.

### QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về quá liều thuốc, tuy nhiên nếu xảy ra quá liều, bệnh nhân phải được đưa vào bệnh viện để theo dõi.

### ĐÓNG GÓI:

Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.

### BẢO QUẢN:

Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C.

### HẠN DÙNG:

3 năm kể từ ngày sản xuất

**TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất

**SẢN XUẤT BỞI:** NEW GENE PHARM INC

649, Sukam-dong Iksan-city, Jeonbuk, Hàn Quốc.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Việt Hùng



Superc