https://trungtamthuoc.com/

R_x Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

KEM BÔI NGOÀI DA
KEDERMFA

" Để xa tầm tay trẻ em"
" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

Thành phần: Cho 1 tube 5 gam
Thành phần dược chất:

Ketoconazol.....100 mg
Neomycin sulfat.....25.000 IU

Thành phần tá dược: Butyl Hydroxy Toluen, Natri metabisulfit, Cremophor A_6, Cremophor A_{25}, Glycerin, Propylen glycol, Cetyl alcol, Acid stearic, Titan dioxyd, Nước cất.

Dạng bào chế:
Kem màu trắng sữa hoặc hơi ngà vàng nhạt, vị đắng, dính được vào da khi bôi.

Chỉ định:
Điều trị tại chỗ nấm da kèm nhiễm khuẩn thứ phát: Nấm da chân, da đùi, da toàn thân, nấm móng, lang ben.

Cách dùng – Liều dùng:
- Rửa sạch và lau khô vùng da bị tổn thương. Thoa một lớp kem mỏng. Mỗi ngày 1 – 2 lần.
- Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định:
- Dị ứng với một trong các thành phần trong công thức.
- Tiền sử mẫn cảm với kháng sinh họ Aminoglycosid.
- Không được uống.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:
- Không dùng trong niêm mạc mắt.
- Không dùng cho vết thương hở, chảy máu.
- Tính an toàn của KEDERMFA trong thai kỳ chưa được thiết lập nên theo nguyên tắc chung không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Để xa tầm tay của trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú:
Không sử dụng đối với phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác tương kỵ của thuốc:
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

https://trungtamthuoc.com/

Tác dụng không mong muốn:

- Hiếm gặp, có thể gây đỏ và cảm giác rát da.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Sử dụng quá liều có thể gây đỏ và cảm giác rát da.

Đặc tính dược lực học:

- Neomycin sulfat là một kháng sinh nhóm Aminoglycosid có tác dụng với phần lớn vi khuẩn Gram (-) và Gram (+) gây nên các nhiễm khuẩn ngoài da.
- Ketoconazol là thuốc trị vi nấm nhóm imidazol, là một kháng nấm có phổ rộng, tác dụng lên nhiều loại nấm gây bệnh.

Đặc tính dược động học:

- Neomycin sulfat được hấp thu qua da, hấp thu của thuốc có thể tăng lên khi niêm mạc bị viêm hoặc bị tổn thương. Khi được hấp thu neomycin được thải trừ nhanh qua thận dưới dạng hoạt tính. Nửa đời của thuốc khoảng 2 – 3 giờ.
- Ketoconazol được hấp thu qua da, chuyển hóa ở gan thành dạng không hoạt động và đào thải chủ yếu qua phân, một phần nhỏ qua nước tiểu.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 1tube x 5 g.

Điều kiện bảo quản:

-Nơi khô mát (dưới 30^0C), tránh ánh sáng.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

4A – Lò Lu – P.Trường Thạnh – Quận 9 – TP.HCM.

ĐT : 028.37300167 - Fax : 028.37301103

Email : qmmediphar03@gmail.com - Web : www.qmmediphar.com