



**CÔNG THỨC:**

Amoxicillin (dạng amoxicillin trihydrat) ..... 500 mg  
Acid clavulanic (dạng muối clavulanat) ..... 125 mg  
Viên bọc và đủ .....

..... 1 viên  
Kasdon XL, avicel M112, magnesi stearat, sopolim LPS14, titan dioxyd, tãc).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nén dài bao phim,

**QUY CÁCH DÙNG DƯỢC:** Hộp 3 vi x 4 viên.

**ĐƯỢC LƯC HỌC:** Amoxicillin là một kháng sinh bán tổng hợp thuộc họ beta - lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Nhưng vì amoxicillin dễ bị phá hủy bởi beta - lactamase, do đó amoxicillin không có tác dụng đối với những chủng vi khuẩn sản sinh ra các enzyme này.

Acid clavulanic có cấu trúc beta - lactam gần giống với penicilin có khả năng ức chế beta - lactamase do phần lớn các vi khuẩn Gram âm và Staphylococcus sinh ra. Đặc biệt, acid clavulanic có tác dụng ức chế mạnh các beta - lactamase truyền qua plasmid gây kháng các penicilin và các cephalosporin. Sự kết hợp acid clavulanic và amoxicillin trong Klamantin giúp cho amoxicillin không bị beta - lactamase phá hủy, đồng thời mở rộng thêm phổ kháng khuẩn của amoxicillin một cách hiệu quả đối với nhiều vi khuẩn thông thường đã kháng lại amoxicillin, kháng các penicilin khác và các cephalosporin.

**ĐƯỢC HẤP HỤC:** Amoxicillin và acid clavulanic đều hấp thu dễ dàng qua đường uống. Đạt nồng độ tối đa trong huyết thanh sau 1 - 2 giờ. Sự hấp thu của thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn và tốt nhất là uống ngay trước bữa ăn. Sinh khả dụng đường uống của amoxicillin là 90% và của acid clavulanic là 75%. Thời gian bán thải của amoxicillin trong huyết thanh là 1 - 2 giờ và của acid clavulanic là khoảng 1 giờ. 55 - 70% amoxicillin và 30 - 40% acid clavulanic được thải qua nước tiểu dưới dạng hoạt động. Probenecid kéo dài thời gian bán thải của amoxicillin nhưng không ảnh hưởng đến sự đào thải của acid clavulanic.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới, đường tiết niệu, da và mô mềm, xương và khớp. Klamantin có tính diệt khuẩn đối với nhiều loại vi khuẩn kể cả các chủng beta - lactamase để kháng với ampicilin và amoxicillin.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Miễn nhiễm với các penicilin và cephalosporin. Suy gan nặng, suy thận nặng. Tiền sử bị vàng da hay rối loạn chức năng gan khi dùng penicilin. Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn.

**THẬN TRỌNG:** Nên điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận. Điều trị kéo dài có thể gây bội nhiễm.

# Klamantin <sup>500</sup>/<sub>125</sub>

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Chưa có bằng chứng nào về tác dụng có hại cho thai nhi, tuy nhiên trong thời kỳ mang thai chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết. Nên thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

**LÀI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Hiếm khi có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Probenecid làm giảm sự bài tiết amoxicillin ở ống thận, do đó làm gia tăng nồng độ amoxicillin trong máu. Thuốc có thể gây kéo dài thời gian chảy máu và đông máu. Thuốc có thể làm giảm tác dụng của thuốc ngừa thai bằng đường uống.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Thường gặp: Tiêu chảy, nôn, buồn nôn.  
Ít gặp: Tăng bạch cầu ái toan. Viêm gan, vàng da ở mặt. Ngứa, ban đỏ, phát ban.

Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, phù Quincke, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu tán máu, viêm đại tràng giả mạc, hội chứng Stevens - Johnson. Viêm thận kẽ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUẢ LIỆU VÀ CÁC HIỂM HỌA:** Dùng quá liều, thuốc ít gây ra tai biến vì được dung nạp tốt ngay cả ở liều cao. Tuy nhiên, những phản ứng cấp xảy ra phụ thuộc vào tình trạng quá mẫn của từng cá thể. Nguy cơ tăng kali huyết khi dùng liều rất cao vì acid clavulanic được dùng dưới dạng muối kali. Có thể dùng phương pháp thẩm phân máu để loại thuốc ra khỏi tuần hoàn.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Liều dùng được tính theo amoxicillin. Uống thuốc ngay trước bữa ăn để giảm triệu hiện buồn không dung nạp thuốc ở dạ dày - ruột.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:  
Nhiễm khuẩn nhẹ, uống 1 viên x 2 lần/ ngày.

Nhiễm khuẩn nặng, uống 1 viên x 3 lần/ ngày.  
Trường hợp suy thận cần phải chỉnh liều cho phù hợp.

Thời gian điều trị kéo dài từ 5 - 10 ngày. Điều trị không được vượt quá 14 ngày mà không thăm lại.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.  
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐHA kiện bảo quản:**  
Bảo quản, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn: TCCC.