

Thành phần

Mỗi gói (7 ml) chứa:

Hoạt chất: Gel khô nhôm hydroxyd 300 mg, magnesi trisilicat 300 mg, simethicon (Dimethylpolysiloxane hoạt hóa) 25 mg.

Tá dược: Dung dịch sorbitol, methyl paraben, natri saccharin, gôm xanthan, povidone K90, propyl paraben, tá dược tạo mùi (Cough Drop Flavour), nước tinh khiết.

Dạng bào chế

Hỗn dịch uống.

Quy cách đóng gói

Hộp 30 gói, mỗi gói chứa 7 ml hỗn dịch.

Chỉ định

Konimag® làm giảm buồn nôn, khó tiêu do dư acid, khó chịu dạ dày và loét đường tiêu hóa.

Liều lượng và cách dùng

Đường dùng: Đường uống.

Người lớn: 1- 2 gói, 3 - 4 lần/ngày.

Thuốc được dùng sau bữa ăn 1 giờ và lúc đi ngủ. Không dùng quá liều chỉ định.

Chống chỉ định

Giảm độ acid.

Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi dùng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Không dùng cho bệnh nhân bị suy thận nặng vì có thể gây tăng magnesi huyết.

Không khuyến điều trị trên 2 tuần trừ khi có lời khuyên của bác sĩ.

Không khuyến dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi trừ khi có lời khuyên của bác sĩ. Nếu cần kết hợp với tetracyclin, nên dùng cách 1-2 giờ.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Nói chung thuốc kháng acid được xem là an toàn với điều kiện là không dùng liều cao kéo dài.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Thuốc kháng acid không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

- Dùng đồng thời với các thuốc kháng acid có thể làm giảm hấp thu, giảm hiệu lực của các thuốc chống tiết cholin. Liều dùng các thuốc này nên cách liều thuốc kháng acid 1 giờ.
- Dùng kéo dài thuốc kháng acid chứa nhôm và/ hoặc magnesi có thể làm giảm hấp thu acid folic do làm tăng pH của ruột non; nên khuyến bệnh nhân dùng thuốc kháng acid ít nhất 2 giờ sau khi dùng acid folic.
- Dùng đồng thời với thuốc kháng acid chứa nhôm có thể làm chậm và giảm hấp thu isoniazid dạng uống; nên tránh dùng đồng thời hoặc khuyến bệnh nhân uống isoniazid 1 giờ trước khi dùng thuốc kháng acid.

Tác dụng không mong muốn

Buồn nôn hoặc nôn

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều

Dùng quá liều thuốc kháng acid có thể gây nhiễm kiềm. Nếu bạn nghi ngờ bị quá liều, hãy gọi đến trung tâm chống độc hoặc cơ sở cấp cứu tại địa phương ngay lập tức.

Hạn dùng:

30 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, trong hộp kín, nơi mát và khô ráo.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

Nhà sản xuất

PT Konimex

Desa Sanggrahan, Kec. Grogol,

Sukoharjo, Indonesia