

**Rx thuốc bán theo đơn**

*Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

**KORUAN Tab.**

[**THÀNH PHẦN**] Mỗi viên chứa:

*Hoạt chất:* Eperisone Hydrochloride 50mg

[**MÔ TẢ**] Viên nén bao đường màu vàng hoặc vàng nhạt.

[**ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC**]

Eperisone Hydrochloride đã được sử dụng ở người lớn theo đường uống với liều 150 mg/ngày, trong 14 ngày liên tục. Vào ngày thứ 1, 8 và 14. thời gian trung bình để đạt tới nồng độ tối đa trong huyết tương nằm trong khoảng từ 1,6 đến 1,9 giờ. Nồng độ tối đa trung bình là từ 7,5 đến 7,9 ng/ml; thời gian bán thải trung bình là 1,6 đến 1,8 giờ.

Eperisone Hydrochloride được hấp thu tốt qua đường tiêu hoá. Thuốc phân bố đều trong máu, não, tủy sống, thần kinh đùi và các cơ. Thuốc được chuyển hóa qua gan, bài tiết một phần qua mật và tham gia vào chu trình gan – ruột. Thuốc thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một phần qua phân.

[**ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ**]

Eperisone Hydrochloride tác động chủ yếu lên tủy sống làm giảm các phản xạ tủy và tạo ra sự giãn cơ vân nhờ làm giảm sự nhạy cảm của thoi cơ thông qua hệ thống ly tâm gamma. Hơn nữa, tác dụng giãn mạch của thuốc làm tăng sự tuần hoàn. Do đó, Eperisone Hydrochloride cắt đứt vòng xoắn bệnh lý mà trong đó sự co cơ khởi phát sự rối loạn của dòng máu, sau đó gây đau và dẫn tới trương lực cơ gia tăng hơn nữa.

Tác dụng cải thiện các triệu chứng khác nhau có liên quan đến sự tăng trương lực cơ của Eperisone Hydrochloride là tổng hợp của các tác dụng dược lý như sau:

- Giãn cơ xương.
- Làm giảm trương lực cơ.
- Giảm sự nhạy cảm của tế bào cảm giác cơ vân và đáp ứng qua nơron vận động.
- Cải thiện dòng máu tới cơ.
- Giãn mạch và tăng lưu lượng tuần hoàn.

[**CHỈ ĐỊNH**]

- Liệt cơ cứng trong các bệnh sau: bệnh mạch máu, liệt cột sống cơ cứng, thoái hoá đốt sống cổ, di chứng sau mổ (bao gồm: u não tủy), di chứng chấn thương (chấn thương cột sống, chấn thương đầu), xơ cứng teo cơ, liệt não, thoái hoá tiểu não, bệnh mạch máu cột sống.
- Cải thiện triệu chứng ưu trương mạch máu trong các bệnh sau: viêm quanh khớp vai, đau lưng.

[**LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG**]

Thường dùng cho người lớn: uống 3 viên/ngày chia làm 3 lần sau bữa ăn.

Liều dùng có thể điều chỉnh theo tuổi và triệu chứng.

[**DÙNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**]

- Độ an toàn của việc dùng thuốc cho phụ nữ có thai chưa được xác lập. Thuốc được dùng cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai khi lợi ích của việc điều trị có giá trị hơn bất kỳ một nguy cơ nào có thể xảy ra.
- Thuốc được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ cho con bú. Nếu bắt buộc phải dùng, phải ngưng không cho con bú.

[**DÙNG THUỐC CHO NGƯỜI CAO TUỔI**]

Người cao tuổi thường có chức năng tâm thần suy giảm, do vậy nên có các biện pháp như giảm liều và giám sát chặt chẽ.

[**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**]

Thuốc được chống chỉ định ở bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

[**THẬN TRỌNG**]

1. Thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân sau:
  - Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với thuốc.
  - Bệnh nhân rối loạn chức năng gan.
2. Thận trọng đặc biệt: các triệu chứng như mệt mỏi, nhẹ đầu, buồn ngủ hoặc các triệu chứng khác có thể xảy ra. Nếu gặp các triệu chứng đó phải giảm liều hoặc ngưng điều trị. Bệnh nhân cần được cảnh báo không có những hoạt động có thể gây nguy hiểm như vận hành máy móc hoặc lái xe.

[**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**]

Tác dụng phụ của thuốc rất hiếm gặp và chỉ thấy ở một số ít trường hợp. Các tác dụng phụ là: giãn cơ, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, chán ăn, ngủ gà, ban da, tiêu chảy, khó tiêu, khó chịu ở dạ dày, mất ngủ, đau đầu, táo bón...

*Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc*

[**TƯƠNG TÁC THUỐC**]

Dùng thuốc đồng thời với Methocarbamol có thể ảnh hưởng đến thính giác. Có một báo cáo đề cập đến tình trạng rối loạn điều tiết mắt khi dùng kết hợp Methocarbamol với Tolperisone Hydrochloride ( Một chất có cấu trúc tương tự Eperisone Hydrochloride).

[**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ**]

Chưa có dữ liệu đầy đủ về sử dụng quá liều Eperisone Hydrochloride. Tuy nhiên đã có báo cáo trường hợp trẻ em bị lên cơn động kinh khi bất ngờ ăn phải một lượng quá liều thông thường Eperisone Hydrochloride. Vì vậy nên sử dụng đúng liều được chỉ định.

[**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN**] Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ phòng.

[**HẠN DÙNG**] 36 tháng kể từ ngày sản xuất

[**ĐÓNG GÓI**] 10 viên x 10 vỉ/ hộp, 10 viên x 2 vỉ/ hộp.

[**TIÊU CHUẨN**] Tiêu chuẩn nhà sản xuất

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

**SĐK : VN-5397-10**

**Y**  
PHARMACEUTICAL  
**YOORYOUNG**

482-17, Chukhyun-vi, Kwanghyeonsa-myeon, Incheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea  
Tel : 02-6207-6114 Fax: 02-6207-6137