

MẪU NHÃN

1.- Mẫu gói 20g:

CHỈ ĐỊNH: Lâm cứu các triệu chứng do tăng acid dạ dày (chứng ợ nóng, ợ chua, đầy bụng khó tiêu do tăng acid); Điều trị tăng acid dạ dày trong loét dạ dày tá tràng; Phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do stress; Điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc; Các trường hợp mẫn cảm với nhôm hoặc các chế phẩm chứa nhôm; Bệnh nhân suy thận nặng. LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: • Thông thường, uống 1 – 2 gói/lần, 2 – 3 lần/ngày. • Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thường gặp: táo bón. Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XATẤM TAY CỦA TRẺ EM BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG. Tiêu chuẩn: TCCS Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA 184/2, Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ĐT: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446 <i>Sản xuất tại chi nhánh</i> CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương LSX: HD:	HỖN DỊCH UỐNG Ladolugel LD Nhóm phosphat gel  GMP-WHO THÀNH PHẦN: Mỗi gói 20g chứa: Nhóm phosphat gel chứa 20% $AlPO_4$ 12,38g Tá dược.....vd 20g SBK:  Nhà sản phẩm và kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR® 18 - Ngô Quyền - P.6 - Tp Đà Lạt Tel: (063) 832020 - 824167 Fax: 04.83.822385
---	--

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22/6/17



TỔNG GIÁM ĐỐC
CN. Hoàng Văn Hòa

Hỗn dịch uống Hộp 26 gói x 20g

Ladolugel LD

Nhóm phosphat gel 20% 12,38g



GMP-WHO



Hỗn dịch uống

Ladolugel LD

Nhóm phosphat gel 20% 12,38g

Nhà phân phối và kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA

LADOPHAR®

18 Ngõ Quận, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: (063) 3832020 – 3834167 • Fax: (063) 3832289
Website: www.ladolugel.com • Email: ladopharcorp@gmail.com

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA
18/4/2, Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (08) 38440106 Fax: (84-8) 38440446
Sân xuất tại chi nhánh
CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

LSX:
NSX:
HSD:

SDK:
Tiêu chuẩn: TCCS

**BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG,
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Hỗn dịch uống Hộp 26 gói x 20g

Ladolugel LD

Nhóm phosphat gel 20% 12,38g



GMP-WHO



TỔNG GIÁM ĐỐC
CN. Hoàng Văn Hòa

Hỗn dịch uống

Ladolugel LD

Nhóm phosphat gel 20% 12,38g

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 20g chứa:
Nhóm phosphat gel chứa 20% AlPO₄12,38g
Tá dược:v d 20g

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- Thông thường, uống 1 – 2 gói/lần, 2 – 3 lần/ngày.
- Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu.

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN,
TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

W

3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC – ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hỗn dịch uống

Ladolugel LD

GMP – WHO

Nhôm phosphat gel 20%

12,38g

THÀNH PHẦN: Cho mỗi gói 20g
Nhôm phosphat gel chứa 20 % $AlPO_4$ 12,38g
Tá dược vđ. 20 g
(Tá dược: Sorbitol, đường trắng, natri CMC, natri citrat, methylparaben, propylparaben, ethanol 96%, menthol, nước tinh khiết).

DẠNG VÀ TRÌNH BÀY: Hỗn dịch uống. Gói 20 g. Hộp 26 gói.

CHỈ ĐỊNH:

- ◆ Làm dịu các triệu chứng do tăng acid dạ dày (chứng ợ nóng, ợ chua, đầy bụng khó tiêu do tăng acid).
- ◆ Điều trị tăng acid dạ dày trong loét dạ dày tá tràng.
- ◆ Phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do stress.
- ◆ Điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

- ◆ Thông thường, uống 1 – 2 gói/lần, 2 – 3 lần/ngày.
- ◆ Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- ◆ Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- ◆ Các trường hợp mẫn cảm với nhôm hoặc các chế phẩm chứa nhôm.
- ◆ Bệnh nhân suy thận nặng.

THẬN TRỌNG:

- ◆ Tránh điều trị liều cao lâu dài ở người bệnh suy thận.
- ◆ Nếu điều trị thuốc kháng acid trong vòng 2 tuần mà không đỡ các triệu chứng như đầy bụng, ợ nóng, ợ chua thì phải đi khám bệnh.
- ◆ Nếu táo bón có thể dùng xen kẽ hoặc chuyển sang dùng thuốc kháng acid chứa magnesit.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI HAY CHO CON BÚ:

- ◆ Thời kỳ mang thai: Các thuốc kháng acid được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài liều cao.
- ◆ Thời kỳ cho con bú: Mặc dù một lượng nhỏ nhôm được thải trừ qua sữa, nhưng nồng độ không đủ gây tác hại đến trẻ bú mẹ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HAY VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ◆ Tất cả các thuốc kháng acid đều có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu của các thuốc dùng đồng thời, do làm thay đổi thời gian dịch chuyển qua đường dạ dày ruột hoặc do liên kết hoặc tạo phức với thuốc. Ví dụ: Tetracyclin tạo phức với các thuốc kháng acid, do vậy, dùng tetracyclin phải cách 1 - 2 giờ trước hoặc sau khi dùng các thuốc kháng acid.
- ◆ Các thuốc kháng acid làm giảm hấp thu các thuốc: Digoxin, indomethacin, muối sắt, isoniazid, clodiazepoxid, naproxen.
- ◆ Các thuốc kháng acid làm tăng hấp thu dicumarol, pseudoephedrin, diazepam.
- ◆ Các thuốc kháng acid làm tăng pH nước tiểu, làm giảm thải trừ các thuốc là base yếu, tăng thải trừ các thuốc là acid yếu (amphetamin, quinidin là các base yếu, aspirin là acid yếu).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thuốc có thể gây táo bón, nên tăng lượng nước uống hàng ngày trong trường hợp này.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ: (chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ).

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn dùng.

CÁCH SỬ DỤNG:




1 Dùng tay nắn gói thuốc đến khi có một hỗn dịch đồng nhất.



2 Giữ gói thuốc thẳng đứng, cắt hoặc xé một góc gói thuốc.



3 Dùng tay nắn hỗn dịch qua miệng gói thuốc.



4 Thuốc được dùng nguyên chất hay pha loãng trong một ít nước.

**BAO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, HÃY HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ.**



LADOPHAR®
Nhà phân phối và kinh doanh:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG **LADOPHAR®**
18 - Ngõ Quyển - P.6 - Tp. Đà Lạt
ĐT: (063) 832020 - 824167 Fax: (84.63) 822369



VIDIPHA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư **VIDIPHA**
184/2 Lê Văn Sĩ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM
ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446
Sản xuất tại chi nhánh:
CÔNG TY CPDP T.Ư VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

TỔNG GIÁM ĐỐC
CN. Hoàng Văn Hòa

TUO.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng