

<https://trungtamthuoc.com/>

163/167



Thành phần/Composition: 60% viên nén dẻo bao phim
chứa L-ornithine L-aspartate
L-ornithine L-aspartate 500mg
Tá dược: cellulose, sucrose

Chỉ định, Cách dùng - Indication, Dosing:
cấp cứu, phòng tê khacks/ indications, administration - Disease,
Condition/illness and other information:
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp
See the package insert inside.

Hàm lượng/Strength:
hàng/lot: 500mg/1v
Item in a tray: 500mg/1v



CỤC



Hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bán theo đơn

LETSUXY

- **Dạng thuốc:** Viên nén dài bao phim.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim.

- **Thành phần:** Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

L-Ornithin L-Aspartat 500mg

Tá dược vd 1 viên

(Tá dược gồm: Microcystalline cellulose, copovidone, bột talc, magnesi stearat, nipasol, nipagin, titan dioxyd, PEG 6000, hydroxypropyl methylcellulose).



- **Dược lực học:**


L-ornithin L-aspartat là sự kết hợp hai amino acid quan trọng trong chu trình chuyển hóa gan. Tăng khả năng khử độc ở gan, cải thiện cân bằng năng lượng. Tác dụng tốt trong suy chức năng gan, thúc đẩy tái tạo tế bào gan.

L-ornithin L-aspartat kích thích sự sản xuất acid uric trong chu trình urê ở gan và kích thích việc sản xuất glutamin làm giảm thiểu nồng độ ammoniac.

- **Dược động học:** Cả 2 acid amin này đều được hấp thu tốt qua đường tiêu hoá. Chưa có báo cáo về quá trình hấp thu, chuyển hoá, thải trừ.

- **Chỉ định:** điều trị các trường hợp :

- + Rối loạn chức năng gan, viêm gan cấp và mạn tính như gan nhiễm mỡ, xơ gan.
- + Hội chứng tăng amoniac máu, giai đoạn đầu rối loạn nhận thức (tiền hôn mê) hoặc biến chứng thần kinh (hỗn mê gan – não)



- **Cách dùng và liều dùng:**

Trừ khi có chỉ định khác, liều thông thường 6-12 viên, lên tối 3 lần/ngày. Uống sau bữa ăn.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Suy giảm chức năng thận.

- **Thận trọng:** Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ, nôn, hoặc buồn nôn.

* *Ghi chú:* "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có tài liệu báo cáo.

- Quá liều và xử trí: Chưa có tài liệu báo cáo.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* *Lưu ý:* Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.



ĐỀ XÁ TÀM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4- La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203



TUẤN CUC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thúy