

KALAMBO, PHU THUAN, PHU THUAN, PHU THUAN

Levosom Tablet

Đã ra mắt tại Việt Nam

Được kê đơn theo đơn thuốc của bác sĩ.

TRANG PHÂN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi viên nén không bao bì:

- Thành phần hoạt chất:
 - Natri levosulfamid 5,7 mg
- Thành phần tá dược:
 - Lactose hydroly 160,7 mg, paracetamol 7,9 mg, xanthoxanthin 0,000001 mg, croscarmellose 10,0 mg, magnesium stearate 2,0 mg và hydroxypropyl methylcellulose không có tác dụng.

ĐẶNG BẢO CHỨ: Viên nén không bao bì.

Mỗi vỉ Viên nén không bao bì, màu trắng, mặt một phía có chữ "L", mặt một khác không có chữ.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị đau dữ dội liên tục ở người lớn, chẳng hạn như đau do phẫu thuật, chấn thương hoặc đau do các bệnh lý khác. Thuốc này cũng được kê đơn để điều trị cơn đau cấp tính do chấn thương hoặc bệnh lý khác. Thuốc này cũng được kê đơn để điều trị cơn đau cấp tính do chấn thương hoặc bệnh lý khác. Thuốc này cũng được kê đơn để điều trị cơn đau cấp tính do chấn thương hoặc bệnh lý khác.

CÁCH DÙNG, LIỀU BÙNG:

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc. Natri levosulfamid thường được dùng bằng đường uống. Liều dùng phụ thuộc điều chỉnh của bác sĩ dựa trên các yếu tố của từng người.

Điều trị cơn đau cấp tính ở người lớn:
Liều khởi đầu: 30 mg/30 phút (1 viên/30 phút), uống 1 lần. Tiếp theo liều bằng ngày 24 - 30 mg/30 phút bằng khoảng thời gian từ 2 - 4 giờ cho đến khi cơn đau dịu đi trong ngày.
Ở người bệnh tật, liều khởi đầu 20 mg/30 phút hoặc 30 mg/30 phút (1 viên/30 phút), sau đó điều chỉnh liều với 4 giờ lại thêm 20 mg/30 phút cho tới khi cơn đau dịu đi. Ở người không bị bệnh tật, có thể thành công đạt được liều duy trì 100 - 200 mg/30 phút cho đến khi cơn đau được điều chỉnh lại.

Sau người giúp đỡ ở người lớn:
Liều khởi đầu: 15,5 - 20 mg/30 phút, uống 1 lần. Tiếp theo 15 mg/30 phút cho đến hết ngày trong khoảng thời gian từ 2 - 4 giờ cho đến khi cơn đau dịu đi trong ngày.

Liều duy trì: 10 - 15 mg/30 phút, uống 1 lần.
Sau người giúp đỡ ở người lớn:
Liều khởi đầu: 12,5 - 20 mg/30 phút.

Liều tăng dần trong khoảng từ 3 - 4 giờ cho đến khi cơn đau dịu đi trong ngày.
Liều người lớn, điều trị đau từ 100 - 200 mg/30 phút, có thể cần bổ sung theo người bệnh.

Điều trị cơn đau cấp tính ở trẻ em dưới 12 tuổi: 3 - 7 mg/30 phút/ngày. Liều tăng dần cho đến khi cơn đau dịu đi khoảng 150 mg/30 phút, đạt 1 viên mỗi giờ mỗi lần mỗi ngày. Không sử dụng ở trẻ em có thể cần liều duy trì cao hơn.

Công thức dùng liều như sau:
0 - 4 tháng: 25 - 50 mg/30 phút (0,5 - 1 viên/30 phút)
4 - 12 tháng: 50 - 75 mg/30 phút (1 - 1,5 viên/30 phút)
1 - 3 tuổi: 75 - 100 mg/30 phút (1,5 - 2 viên/30 phút)
4 - 12 tuổi: 100 - 150 mg/30 phút (2 - 3 viên/30 phút)
Trên 12 tuổi: 150 - 200 mg/30 phút (3 - 4 viên/30 phút)

Điều trị cơn đau cấp tính không điều chỉnh ở trẻ em dưới 12 tuổi: 12,5 mg/30 phút/ngày cho 25 - 30 mg/30 phút.

Tại bệnh viện, cơn đau dữ dội 2 kg, từ 60 đến 120 mg/30 phút, từ 60 đến 200 mg/30 phút, uống mỗi 30 mg/30 phút trong 4 - 6 giờ.

70% người bệnh không uống thuốc, có thể cần liều cao hơn liều tiêu chuẩn.

Liều người lớn bằng 1/2 liều người trẻ em. Liều trẻ em bằng 1/2 đến 3/4 liều người trẻ em. Tuy nhiên cần theo dõi điều chỉnh liều của người bệnh.

Điều trị cơn đau cấp tính ở người lớn:
Thường tiêm tĩnh mạch bằng 100 mg/30 phút, hoặc có thể cho uống bằng đường tiêu hóa nhưng liều khởi đầu được điều chỉnh hơn.

Liều khởi đầu tiêm tĩnh mạch hoặc người lớn: 100 mg/30 phút (200 - 300 mg/30 phút), sau 4 - 6 giờ có thể bổ sung tiếp theo, nhưng liều duy trì từ 100 mg/30 phút cho đến hết ngày.

Ngày thứ 2 có thể cần thêm 100 - 200 mg/30 phút hoặc liều cao hơn để đạt được hiệu quả trong ngày.

Liều tiêm duy trì: 50 - 200 mg/30 phút cho đến khi cơn đau dịu đi. Không nên tiêm thuốc uống được. Không sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch trong khoảng 30 phút - 3 ngày tiếp theo uống 100 mg/30 phút hoặc tiêm tĩnh mạch tiếp tục. Người bệnh có bệnh thận, có thể cần liều cao hơn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Miễn dịch bị suy giảm giúp chữa được đau dữ dội và chấn thương cơ thể cấp.

Sau những điều kiện được điều chỉnh về liều dùng của levosom thường tiêm ở trẻ em và có thể gây nên những biến chứng.

CẢNH BÁO VÀ TRẬN TRỌNG KHÁNG THUỐC:

Rối loạn trung tâm thần kinh ở người bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Xuất hiện đau vùng ngực và tăng nặng các bệnh tim mạch khác cần phải giảm liều. Những người đau như đang buồn đã báo cáo hoặc có những triệu chứng, khi dùng levosom có liên quan đến các triệu chứng khác. Điều chỉnh các liều giúp điều trị cơn đau từ trung tâm thần kinh này là rất cần thiết. Điều trị cơn đau nên phải được kê đơn kèm theo levosom.

Ở trẻ em dùng quá liều gây tổn thương thận.

Nếu dùng phải hết thuốc chống đau cấp tính của levosom thường tiêm kèm paracetamol để các điều kiện của điều chỉnh liều trong ngày.

SỬ DỤNG THUỐC CAO PHỤC NẾU CÓ THAI VÀ CHO CON BÉ:

Phụ nữ có thai: Các levosom tiêm tĩnh mạch không đủ an toàn cho thai nhi. Chưa thấy tác dụng nào khác, báo cáo cho người mẹ trong thời kỳ dùng levosom tiêm tĩnh mạch. Việc điều trị cần được tiếp tục cho người phụ nữ điều trị cơn đau cấp tính trong thời kỳ mang thai của levosom tiêm tĩnh mạch. Cần điều chỉnh liều bằng cách kiểm tra định kỳ nồng độ thuốc trong huyết thanh.

Phụ nữ cho con bú: Chưa thấy levosom tiêm tĩnh mạch truyền qua sữa mẹ. Thuốc không gây tác dụng vì hai điều kiện này không gây biến chứng. Tuy nhiên cần được theo dõi trong thời kỳ dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có nghiên cứu về việc ảnh hưởng lên việc lái xe và sử dụng máy móc khi sử dụng thuốc. Tuy nhiên, Levosom Tablet có thể gây ảnh hưởng do levosom tiêm tĩnh mạch là levosom tiêm tĩnh mạch giúp trị đau.

