

# LINH CHI

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- **Để xa tầm tay trẻ em.**
- **Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**
- **Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng; bạn có thể cần phải đọc lại.**

### THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC:

Mỗi viên nang cứng chứa:

- Cao lỏng linh chi (10/1) (tương đương 600 mg linh chi - *Ganoderma lucidum*) ..... 60 mg
- Tá dược: Natri benzoat, Màu caramel, Lactose, Povidon K90, Colloidal silicon dioxid A200, Magnesi stearat, Nang cứng gelatin (số 1).

### MÔ TẢ SẢN PHẨM:

**Dạng bào chế:** Viên nang cứng.

**Hình thức:** Viên nang cứng số 1, thân nang màu đỏ, nắp nang màu đỏ. Bên trong chứa bột thuốc màu nâu, đồng nhất trong cùng một lô, có mùi thơm dược liệu.

### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 4 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

### THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

- Điều trị suy nhược thần kinh, chóng mặt, mất ngủ, viêm gan mạn tính, viêm phế quản mạn tính, bệnh tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, bệnh động mạch vành tim, loét mạn tính đường tiêu hóa, thấp khớp, thống phong.

- Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

### NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

**Đường dùng:** Đường uống.

**Cách dùng:** Dùng uống với nước ấm.

### Liều thường dùng:

Ngày 2 - 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

### KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Nếu bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa phát hiện phản ứng nào có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu bạn phát hiện tác dụng không mong muốn chưa được đề cập trong tờ hướng dẫn này, hãy báo cáo cho bác sĩ của bạn biết.

### NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

**Thực phẩm:** Thức ăn và đồ uống không có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

### Dùng các thuốc khác:

Chưa có báo cáo.

### CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu bạn quên uống một liều dùng, hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

### CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

### NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU?

Chưa có báo cáo.

### CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?

#### Cách xử trí quá liều

- Nếu bạn hay bất kỳ ai khác (như trẻ em) uống quá nhiều viên thuốc, hãy gặp ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

### NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

Chưa có báo cáo.

### Phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có tài liệu nào xác nhận phản ứng có hại gây nguy hiểm khi dùng thuốc nhưng thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao và các trường hợp khác.