

XIN ĐỌC KỸ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC  
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ

## LOCACID®

Kem thoa da chứa 0,05% tretinoin

### 1. TÊN THUỐC

Tên biệt dược: LOCACID

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Tretinoin 0,05g

Tá dược: Acid sorbic, butyl hydroxyanisol, parum 7151/1, trolamin, carbome 980, paraffin lỏng, macroglycol glycerol hydrostearat, alpha tocopherol acetat, macrogol 600, butyl hydroxytoluen, methyl parahydroxybenzoat, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 100g kem.

Dạng bào chế: Kem thoa ngoài da.

### 2. CHỈ ĐỊNH

Điều trị các dạng lâm sàng khác nhau của mụn trứng cá (trừ bệnh rosacea):

- Mụn trứng cá thông thường: đa dạng hay có nhân mụn, có nang trứng cá;
- Các dạng mụn trứng cá khác (phát ban dạng trứng cá); mụn trứng cá do dùng thuốc như corticoid, barbiturate..., mụn trứng cá do bệnh nghề nghiệp (do tiếp xúc với các tác nhân gây nổi mụn trứng cá như dầu, hydrocarbon halogen hóa...);
- Bệnh Favre - Racouchot.

### 3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG

- Trước khi sử dụng nên thử độ nhạy cảm trên vùng da nhỏ.
  - Tránh bôi thuốc lên mắt, miệng, lỗ mũi và niêm mạc. Nếu lỡ bôi lên những vùng này, phải rửa sạch với nhiều nước.
  - Đặc biệt thận trọng khi dùng chung với những thuốc bôi ngoài da khác, nhất là các thuốc gây tróc vảy da. Nếu trước khi điều trị bằng thuốc này, bệnh nhân đã điều trị bằng các thuốc gây tróc vảy da, phải chờ các sang thương da lành hẳn.
  - Trong thời gian điều trị tránh phơi nắng hoặc tiếp xúc với tia cực tím vì sẽ làm tăng kích ứng da. Nếu bị phỏng nắng, phải chờ cho các triệu chứng lành hẳn mới bôi thuốc tiếp.
  - Tránh dùng đồng thời với các sản phẩm có chứa hương liệu hay cồn do có thể làm tăng kích ứng.
  - Tránh vệ sinh da quá thường xuyên. Hai lần một ngày là đủ. Nên để da khô tự nhiên, tránh dùng khăn chà xát.
- NẾU CÓ NGHI NGỜ, NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ.**
- Có thai và cho con bú:** Thuốc này không nên dùng trong thai kỳ. Nói chung, trong thời kỳ thai nghén và cho con bú, phải tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thuốc này.

### 4. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Thoa thuốc hàng ngày, tốt nhất vào buổi tối, nửa giờ trước khi đi ngủ. Da phải thật khô (15 phút sau khi làm vệ sinh da).

Thoa một lượng bằng hạt đậu lên tổn thương cần điều trị và xoa nhẹ nhàng đến khi thấm hết.

### 5. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiệu lực của các sản phẩm chứa Tretinoin gắn liền với một số phản ứng phụ ngoài da, xuất hiện trong những tuần đầu điều trị, đặc trưng bằng những hồng ban khô, hơi đau, thường khu trú ở vùng quanh miệng và cổ.

Các phản ứng này có thể nặng hay nhẹ, thường là tạm thời. Các phản ứng này được xem là bình thường nếu không quá nặng, trong chừng mực mà bệnh nhân chịu đựng được và sẽ khỏi khi giảm liều.

Ngoài ra, có một giai đoạn bộc phát mụn trứng cá tạm thời. Phản ứng này là bình thường do việc loại bỏ nhanh chóng các nang trứng cá đã được hình thành sâu dưới da. Vì có chứa butyl hydroxyanisol và butyl hydroxytoluen, thuốc này có thể làm cho da, mắt và niêm mạc bị kích thích.

Vì có chứa methyl parahydroxybenzoat, thuốc có thể gây ban ngứa ngoài da hoặc viêm da tiếp xúc.

**KHI GẤP BẤT CỬ TÁC DỤNG PHỤ NÀO KHÔNG ĐƯỢC NẾU TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.**

### 6. TƯƠNG TÁC THUỐC

ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ THỂ XẢY RA CẦN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TẤT CẢ CÁC LOẠI THUỐC QUÝ VỊ ĐANG SỬ DỤNG.

### 7. BẢO QUẢN

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không nên dùng thuốc quá thời hạn được ghi trên bao bì.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

### TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Quy cách: Hộp 1 tuýp 15g hoặc 30g.

Tên và địa chỉ công ty sản xuất:

CÔNG TY TNHH PIERRE FABRE VIỆT NAM

Số 1, đường 4A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai

ĐT: 061 383 6770

Fax: 061 383 6570

P05-LOC-01



**Pierre Fabre**