



S.Đ.P. 02300243.2.P.T.N. NG
 CÔNG TY
 TNHH
 PHIL INTER
 PHARMA
 H. THUA THIEN
 T. NGUYEN

TRUNG TÂM THUỐC CHẤT LƯỢNG
 CÔNG TY
 TNHH
 PHIL INTER
 PHARMA
 H. THUA THIEN
 T. NGUYEN

BỘ Y TẾ
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 12.1.8.2014


Composition: Each unit contains
 L-Ornithine L-Aspartate 300mg
 Indications: asthenia, convulsions
 & other indications. See insert leaflet
 Storage: in a hermetic container. Store 30°C
 protected from light.
 Package: 10 blisters x 10 unit capsules
 Keep out of reach of children
 Read insert leaflet carefully before use
 PHIL PHIL INTER PHARMA
 02300243

10 blisters x 10 unit capsules
LUBIRINE
 L-Ornithine L-Aspartate 300mg

Thành phần: Mỗi viên nang chứa
 L-Ornithine L-Aspartate
 300mg tương đương
 100mg mỗi chất.
 Chỉ định: Trạng thái suy nhược, mệt mỏi
 kéo dài, mất ngủ, mất cân bằng điện giải
 và các rối loạn khác.
 Cách dùng: Uống 1 viên nang 3-4 lần mỗi ngày
 sau bữa ăn.
 Liều lượng: 10 viên nang mỗi ngày
 Đối tượng sử dụng: Mọi lứa tuổi
 Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ
 30°C, tránh ánh sáng.
 Hãng sản xuất: Công ty TNHH
 PHIL INTER PHARMA
 25, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore,
 Thuận An, Bình Dương
 S.Đ.P. 02300243
 S.Đ.P. 02300243
 S.Đ.P. 02300243

10 viên nang tương đương
LUBIRINE
 L-Ornithine L-Aspartate 300mg

WHO GMP



Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

LUBIRINE

SĐK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: L-Ornithine L-Aspartate300mg

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, dầu đậu nành hydro hóa một phần, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, titan dioxyd, màu đỏ số 40, màu vàng số 4, màu vàng số 5, màu xanh dương số 1, nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

L-Ornithine L-Aspartate là một acid amin được dùng trong điều trị bệnh tăng amoni huyết, xơ gan và bệnh não gan.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1 – 3 viên/lần x 3 lần/ngày, sau khi ăn, trong 1 - 2 tuần. Duy trì: 1 viên x 3 lần mỗi ngày trong 4 – 5 tuần tùy theo chỉ dẫn của bác sĩ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy thận nặng.

THẬN TRỌNG

Không sử dụng thuốc khi thuốc hết hạn hoặc có sự thay đổi về mùi hoặc màu sắc.

Trẻ em, người già, phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được xác định.

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

L-Ornithine L-Aspartate không có tác dụng phụ rõ ràng. Buồn nôn, nôn thoáng qua có thể xảy ra.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên nang mềm. Hộp 3 vi, 5 vi, 10 vi .

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng