



BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 12.1.8.2014

S.Đ. P. 02300243.2.0.T.N.8  
CÔNG TY  
THANH  
PHIL INTER  
PHARMA  
H. THUA THIEN  
T. THANH HOA

TẠO MẪU CHẤT LƯỢNG  
CÔNG TY  
THANH  
PHIL INTER  
PHARMA  
H. THUA THIEN  
T. THANH HOA

Composition: Each unit contains  
L-Ornithine L-Aspartate 300mg  
Indications: asthenia, convalescence  
& other indications. See insert leaflet  
Storage: in a hermetic container, below 30°C,  
protected from light.  
Package: 10 blisters x 10 unit capsules  
Keep out of reach of children  
This insert paper is not to be used  
PHIL PHIL INTER PHARMA  
100% PHARMA


10 blisters x 10 unit capsules  
**LUBIRINE**  
L-Ornithine L-Aspartate 300mg

Thành phần: Mỗi viên nang chứa  
L-Ornithine L-Aspartate  
Chỉ định: nhược năng, kiệt sức sau  
bệnh và khác.  
Xin đọc bảng kê thành phần và dùng  
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Công ty  
PHIL INTER PHARMA  
Đường gô: 75, An X, 10 nước tăng men  
Đối tượng sử dụng  
Lưu ý: Mọi chi tiết xin đọc kỹ bảng kê  
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát  
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA  
75, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore,  
Thừa Thiên Huế, Việt Nam  
SĐT: 091 23 23 23  
Fax: 091 23 23 23  
MST: 031232323

10 vi x 10 viên nang mềm  
**LUBIRINE**  
L-Ornithine L-Aspartate 300mg

WHO GMP

Đã xa tâm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ



## LUBIRINE

SĐK: .....

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

*Hoạt chất:* L-Ornithine L-Aspartate .....300mg

*Tá dược:* Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, dầu đậu nành hydro hóa một phần, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, titan dioxyd, màu đỏ số 40, màu vàng số 4, màu vàng số 5, màu xanh dương số 1, nước tinh khiết.

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang mềm

### CHỈ ĐỊNH

L-Ornithine L-Aspartate là một acid amin được dùng trong điều trị bệnh tăng amoni huyết, xơ gan và bệnh não gan.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1 – 3 viên/lần x 3 lần/ngày, sau khi ăn, trong 1 - 2 tuần. Duy trì: 1 viên x 3 lần mỗi ngày trong 4 – 5 tuần tùy theo chỉ dẫn của bác sĩ

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy thận nặng.

### THẬN TRỌNG

Không sử dụng thuốc khi thuốc hết hạn hoặc có sự thay đổi về mùi hoặc màu sắc.

Trẻ em, người già, phụ nữ có thai và cho con bú.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được xác định.

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

### ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

L-Ornithine L-Aspartate không có tác dụng phụ rõ ràng. Buồn nôn, nôn thoáng qua có thể xảy ra.

*\* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

### QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.

**BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*\* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

**ĐÓNG GÓI:** Vi 10 viên nang mềm. Hộp 3 vi, 5 vi, 10 vi .

Sản xuất bởi

**CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA**

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương



PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Việt Hùng*