

Tờ hướng dẫn sử dụng



Thuốc nhỏ mắt
LUBROP

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml.

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch nhỏ mắt.

Mô tả: Dung dịch trong, màu vàng, không có cặn vẩn, vật lạ.

THÀNH PHẦN:

	Lọ 5 ml	Lọ 6 ml	Lọ 7 ml	Lọ 8 ml	Lọ 10 ml
Thành phần hoạt chất:					
Vitamin B ₁ (Thiamin hydroclorid)	2,5 mg	3 mg	3,5 mg	4 mg	5 mg
Vitamin B ₂ (dưới dạng Riboflavin natri phosphat)	0,1 mg (0,125 mg) (*)	0,12 mg (0,15 mg) (*)	0,14 mg (0,175 mg) (*)	0,16 mg (0,2 mg) (*)	0,2 mg (0,25 mg) (*)
Vitamin PP (Nicotinamid)	20 mg	24 mg	28 mg	32 mg	40 mg
Thành phần tá dược:					
Acid boric, Natri borat, Benzalkonium clorid, Dinatri edetat, Natri clorid, Borneol, Menthol, Propylen glycol, Nước cất	Vừa đủ	Vừa đủ	Vừa đủ	Vừa đủ	Vừa đủ



(*): khối lượng trong ngoặc được tính theo dạng muối riboflavin natri phosphat

TÁC DỤNG:

- Vitamin B₁: đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa tinh bột (glucid). Sự chuyển hóa này cung cấp năng lượng cho tế bào mắt, giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt do thiếu năng lượng.
- Vitamin B₂: cung cấp vitamin B₂ cho mắt sẽ giúp mắt tránh được những triệu chứng khó chịu thường gặp phải như đỏ mắt, ngứa mắt, viêm giác mạc. Nếu thiếu vitamin B₂ trong trường hợp nặng sẽ gây xơ mạch giác mạc.
- Vitamin PP: rất cần thiết đối với quá trình oxy hóa khử trong hô hấp của tế bào mắt. Do tính chất chống dị ứng, vitamin PP còn được sử dụng trong việc điều trị viêm kết mạc do dị ứng và giúp bảo vệ niêm mạc mắt.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc nhỏ mắt Lubrop cung cấp vitamin cho mắt, được chỉ định dùng trong các trường hợp sau:

- Mỏi mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt, khô mắt,...
- Phòng ngừa các tổn thương bề mặt giác mạc, viêm giác mạc.
- Vệ sinh và giữ ẩm cho mắt.



LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ngày.

Lưu ý:

- Không dùng chung mỗi lọ cho nhiều người, không chạm vào đầu nhỏ giọt (kể cả mí mắt), đóng chặt nắp lọ ngay sau khi sử dụng để tránh nhiễm khuẩn.
- Lọ thuốc đã mở không dùng quá 15 ngày.
- Sản phẩm tránh ánh sáng, bảo quản lọ thuốc trong hộp sau mỗi lần sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Sản phẩm chứa benzalkonium clorid:

- Có thể gây biến màu đối với kính áp tròng. Do đó, nên tháo kính áp tròng trước khi dùng thuốc và đợi ít nhất 15 phút trước khi mang kính trở lại.
- Có thể gây kích ứng mắt. Nếu thấy mắt bị nhạy cảm bất thường, đau mắt sau khi sử dụng thuốc hãy liên hệ với bác sỹ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Trong trường hợp dùng thuốc quá liều hoặc xảy ra bất kì tình trạng không mong muốn nào, rửa mắt lại bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý ngay lập tức và cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- 15 ngày sau khi mở nắp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



Người soạn thảo: Nga A
Người kiểm tra: Hương
Ngày kiểm tra: 12/10/2023