

3093BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22-02-2018

160x55

THÀNH PHẦN:

Caol lỏng hỗn hợp62,5 ml
(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm:
Thực địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*)40 g
Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 20 g
Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*)20g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*)15 g
Phục linh (*Poria*) 15g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 15g
Tá dược: Nipagin, nipasol, đường vàng, nước tinh khiết
vừa đủ 125ml.

CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hao khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng



LỤC VỊ ÂM



Lo 125 ml cao lỏng



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Trẻ em: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml).
 Người lớn: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh (15ml).
 Có thể pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp.
 Lắc kỹ trước khi dùng.

Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Xem chi tiết trên tờ Hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS SDK:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Không sử dụng thuốc quá hạn

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948

Số lô SX:




512/1616

LỤC VỊ ẨM



LỤC VỊ ẨM

Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hao khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.



Hộp 01 lọ x 125 ml cao lỏng

THUỐC THẢO DƯỢC LỤC VỊ ẨM



THÀNH PHẦN

Cao lỏng hỗn hợp.....62,5 ml
(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm:
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*).....40 g
Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*).....20 g
Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*).....20 g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*).....15 g
Phục linh (*Poria*).....15 g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*).....15 g
Tã được: Nipagin, nipasol, đường vàng, nước tinh khiết vừa đủ 125ml.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

SBK:

Số lô SX:


NSX:

HD:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

LỤC VỊ ẨM

Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hao khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.



Hộp 01 lọ x 125 ml cao lỏng

THUỐC THẢO DƯỢC LỤC VỊ ẨM



CHỈ ĐỊNH

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
- Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hao khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Trẻ em: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml).
- Người lớn: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh (15ml).
- Có thể pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp.
- Lắc kỹ trước khi dùng.

Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Xem chi tiết trên tờ Hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.



Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất
- Quốc Oai, xã Phúồng Xá, huyện Thạch Thất,
TP. Hà Nội.
Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948



www.duocphucvinh.com

55x55x135

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: LỤC VỊ ẨM
2. Mô tả sản phẩm:
 - Chất lỏng màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi chua.
 - Hộp 01 lọ x 125ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 lọ 125 ml

-Cao lỏng hỗn hợp	62,5 ml
(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm:	
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	40,0 g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	20,0 g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	20,0 g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	15,0 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	15,0 g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	15,0 g
-Tà dược: nipagin, nipazol, đường vàng, nước tinh khiết vừa đủ 125 ml	

4. Chỉ định điều trị

- Trẻ em : biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gây cộm, người nóng.
- Người lớn : người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, đi mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

5. Cách dùng và liều lượng

- Trẻ em: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 thìa ca phê(5ml).
- Người lớn: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 thìa canh(15ml).
- Có thể pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp.
- Lắc kỹ trước khi dùng.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người đang bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.
- Người tiểu đường, người dương hư hàn

7. Tác dụng không mong muốn

- Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

8. Tương tác với những thuốc khác

- Chưa có báo cáo

9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
10. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Phụ nữ có thai dùng thận trọng.
 - Thuốc sử dụng được cho phụ nữ cho con bú.
11. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.
12. Bảo quản thuốc
- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
- Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
14. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo
- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.
15. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:
Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

16. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Người có đường huyết tăng.
- Phụ nữ có thai.

17. Khi nào cần tham vấn bác sỹ

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn thì tham vấn ý kiến bác sỹ.

Ngày 14 tháng 06 năm 2017

Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bùng

Tờ hướng dẫn sử dụng

LỤC VỊ ẨM

1. Thành phần: Công thức cho 1 lọ 125 ml

-Cao lỏng hỗn hợp	62,5 ml
(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm:	
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	40,0 g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	20,0 g
Sơn nhũ (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	20,0 g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	15,0 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	15,0 g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	15,0 g)
-Tá dược: nipagin, nipazol, đường vàng, nước tinh khiết vừa đủ 125 ml	

2. Dạng bào chế: Cao lỏng

3. Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ x 125ml

4. Chỉ định điều trị:

- Trẻ em : biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
- Người lớn : người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

5. Liều lượng và cách dùng:

- Trẻ em: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê(5ml).
- Người lớn: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 thìa canh(15ml).
- Có thể pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp.
- Lắc kỹ trước khi dùng.

6. Tác dụng không mong muốn:

- Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

7. Quá liều và xử trí:

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

8. Tương tác thuốc:

- Chưa có báo cáo

9. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người đang bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

Công ty cổ phần dược

 Phúc Vinh

Hồ sơ đăng ký thuốc
LỤC VỊ ẨM

- Người tiểu đường, người dương hư hàn
- 10. Thận trọng:
 - Người có đường huyết tăng.
 - Phụ nữ có thai.
- 11. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
 - Phụ nữ có thai dùng thận trọng.
 - Thuốc sử dụng được cho phụ nữ cho con bú.
- 12. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
 - Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.
- 13. Bảo quản:
 - Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.
- 14. Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất
- 15. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)



*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em*

TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 14 tháng 06 năm 2017

Đại diện công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bào Đình Bảng

