


MẪU QUẢNG CÁO

# SIRÔ LYSINKID

Thuốc bổ cho trẻ em



## GIÚP BÉ ĂN NGON, CHÓNG LỚN



*Nguyễn Thị  
6/10/13*

**CÔNG THỨC:** cho 1 chai 100ml: Vitamin B1 20mg; Vitamin B2 22,32mg; Vitamin B5 66,66mg; Vitamin B6 40mg; Vitamin PP 133,32mg; Lysine hydrochloride 2000mg; Tá dược vừa đủ 100ml. **CHỈ ĐỊNH:** Sirô LYSINKID chứa các vitamin nhóm B và Lysine là thuốc bổ giúp kích thích ăn cho trẻ em và thanh thiếu niên trong giai đoạn tăng trưởng, đang theo một chế độ ăn kiêng đặc biệt hay trong thời kỳ dưỡng bệnh (sau khi bệnh, nhiễm khuẩn hoặc phẫu thuật). Bổ sung vitamin cho cơ thể và phòng ngừa các bệnh do thiếu vitamin nhóm B. **CÁCH DÙNG:** Trẻ em từ 1 - 5 tuổi: 7,5ml/ngày. Trẻ > 5 tuổi, thiếu niên và người lớn: 15ml/ngày. Nên uống thuốc trước bữa ăn sáng hay bữa ăn trưa. Có thể hòa thuốc với nước hay trộn với thức ăn. Lắc kỹ trước khi dùng. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. **THẬN TRỌNG:** Không nên dùng thuốc lâu dài với liều cao hơn liều được khuyến cáo. Không kết hợp với Levodopa trừ khi phối hợp với chất ức chế men dopa-decarboxylase. **THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:** Có thể sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú. **TÁC DỤNG PHỤ:** Nước tiểu có thể bị nhuộm vàng (do Riboflavin). Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Isoniazid, Penicillamin, thuốc ngừa thai dùng đường uống có thể làm thay đổi sự chuyển hóa hoặc tính khả dụng sinh học của Vitamin B6. Vitamin B6 ức chế tác dụng Levodopa. Rượu có thể gây cản trở hấp thu Riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng Riboflavin gây giảm hấp thu Riboflavin ở dạ dày, ruột. Sử dụng Nicotinamide đồng thời với: Thuốc chẹn alpha-adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức. Chất ức chế men khử HMG-CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân. **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: XXXX/XX/QLD-TT, ngày...tháng...năm...; ngày...tháng...năm...in tài liệu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR** - 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

ĐT: 84-8-38650258 - 84-8-38650436 - Fax: 84-8-38650394 - Email: info@mekophar.com - Website: www.mekophar.com



*ĐS. Nguyễn Thùy Vân*