

PHIL
INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Tel: 0650. 3767 040~ 044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm **MAGPHEROL**

Kích thước : 115x42x115 mm

Tỷ lệ : 70%



MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm	: Viên nang mềm MAGPHEROL
Kích thước	: 38 x 100 mm
Tỷ lệ	: 100%
Nội dung	: như mẫu.



Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ



MẪU NHÃN TOA THUỐC

Sản phẩm : Viên nang mềm MAGPHEROL
Kích thước : 103 mm x 200 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung :

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Viên nang mềm **MAGPHEROL**

SĐK....

Read dosage and administration carefully before using.

Keep out of reach of children.

For any more information, please consult your doctor or pharmacist.

MAGPHEROL Soft capsule

Visa No.:

◆ THÀNH PHẦN

Hoạt chất

Tocopherol acetate (vitamin E)..... 500 mg

Magnesi oxyd (MgO)..... 250 mg

(tương đương 150,8 mg Magnesi)

Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, D-sorbitol, titan dioxyd, màu xanh số 1, màu vàng số 5, màu vàng số 4, màu đỏ số 40, nước tinh khiết.

◆ CHỈ ĐỊNH

- Cải thiện tình trạng run giật cơ do thiếu magnesi.
- Cung cấp chất khoáng thiết yếu trong trường hợp hoạt động thể lực quá mức.
- Hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng tuần hoàn ngoại biên (chứng khập khiễng cách hồi, chứng tê cứng chân tay).
- Điều trị tình trạng thiếu vitamin E.

◆ LIỀU DÙNG

Người lớn trên 18 tuổi: 1 viên/ lần, 1 lần/ ngày.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không nên dùng cho bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân đang bị bệnh về thận nghiêm trọng.
- Không dùng thuốc này cho trẻ em.

◆ THẬN TRỌNG

Phải thận trọng sử dụng trong những trường hợp dưới đây:

- Có thể phát sinh chứng huyết khối cho bệnh nhân đang sử dụng estrogen hoặc gây sự nguy hiểm đối với bệnh nhân đang bị chứng huyết khối.
- Phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ mình đang mang thai phải hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC

- Trong trường hợp dùng chung với tetracyclin, thì sẽ giảm khả năng hấp thu của nhau.
- Loại thuốc có chứa Phosphat hoặc calci sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu Magne.
- Magnesium sẽ làm giảm sự hấp thu sắt.
- Nếu sử dụng đồng thời cùng với thuốc chứa sắt thì tác dụng của vitamin E sẽ bị giảm.
- Cholestyramin và liquid paraffin sẽ làm giảm sự hấp thu của những vitamin tan được trong dầu.

◆ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Bởi vì độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai sau khi đã cân nhắc so sánh giữa những nguy cơ có thể xảy ra cho người mẹ và thai nhi với những lợi ích của việc điều trị.

◆ TÁC DỤNG PHỤ

- Có thể bị tiêu chảy, táo bón hoặc khó chịu ở dạ dày.
- Thỉnh thoảng có thể bị phát ban.
- Có báo cáo cho rằng khi sử dụng thuốc trong thời gian dài sẽ thấy tình trạng nôn mửa, mệt mỏi, đau đầu, mắt bị mờ.
- Khi sử dụng vitamin E một ngày trên 1.300 IU, sẽ giảm chức năng sinh dục, bị tổn thương đường ruột, creatinin niệu.
- Khi sử dụng với liều lượng cao trong thời gian dài, có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi.
- Khi liều lượng magnesi tăng thì có thể xuất hiện chứng đi tiêu phân lỏng.

* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng thuốc.

◆ ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm..

◆ BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C.

◆ HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.

◆ TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại:

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

◆ COMPOSITION

Active ingredients

Tocopherol acetate (vitamin E) 500 mg

Magnesium oxide (MgO) 250 mg

(as 150.8 mg Magnesi)

Excipients: Soybean oil, Lecithin, White beeswax, gelatin, glycerine, methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, D-sorbitol, Titanium dioxide, Blue color No. 1, Yellow color No.5, Yellow color No. 4, Red color No. 40, purified water.

◆ INDICATIONS

- Improving convulsions by Magnesium deficiency.
- Supplement essential mineral upon excessive physical exercise.
- Supplementary therapy for peripheral circulatory function disorder (intermittent claudication, chilblain).
- Deficiency of vitamin E.

◆ DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adults over 18 years old: 1 capsule once a day.

◆ CONTRA-INDICATIONS

- This medication should not be used in patients with hypersensitivity to any component of the drug.
- Patients with severe renal insufficiency.
- Take attention not to administer to children.

◆ PRECAUTIONS

Should be administered cautiously to the following patients:

- The risk of occurrence of thrombosis may increase in patients with a factor of thrombosis or treated with estrogen.
- Consult a doctor or a pharmacist when administer to pregnancy, suspected pregnancy.

◆ DRUG INTERACTIONS AND OTHER INTERACTIONS

- Concomitant administration with tetracycline may reduce the absorption each other.
- The agents of phosphate salts and calcium salts may affect the absorption of magnesium.
- The absorption of iron may be reduced by magnesium.
- Concomitant administration with iron agents may reduce the action of vitamin E.
- Cholestyramine with liquid paraffin may reduce the absorption of other lipid vitamins.

◆ PREGNANCY AND LACTATION

Since the safety of this medicine during pregnancy has not been yet established, this medicine should be administered when the potential therapeutic benefits justify the possible risks.

◆ SIDE EFFECTS

- Diarrhea, constipation, symptoms of stomach discomfort may occur.
- Rarely rash may occur.
- It is reported that nausea, fatigue, headache and blurred vision may occur in long-term administration.
- It is reported that gastrointestinal damage, gonadal dysfunction and creatininuria may occur in the patients administered of vitamin E over 1,300IU a day.
- Fatigue by high dosage and long-term administration may occur.
- A weak defecation caused by increase dosage of magnesium may occur.

* Inform your doctor in case of any adverse reactions related to drug use.

◆ PACKAGE: Box of 12 blisters x 5 soft capsules.

◆ STORAGE: In air-tight container, dry and cool place, below 30°C.

◆ SHELF LIFE: 36 months from manufacturing date.

* Do not use if the drug is out of date

◆ SPECIFICATION: Home standard.

Manufactured by

PHIL INTER PHARMA Co., LTD.

25, Street No. 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.