

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 21.02.2018

Mangizeni

Thành phần: Chứa 60 ml
Dịch chiết từ vỏ trái 0,5%
Mangiferin, 12.000 mg, Tween
80, Camphor, Menthol, Vitamin
E, Thymol, Acid benzoic, Natri
benzoat, Muckadot EQ 112,
Nước tinh khiết vừa đủ 60 ml.

Chỉ định: Gel dùng ngoài
Mangizeni dùng gel được
dùng để phòng và điều trị
viêm nhiễm đường sinh dục,
thích hợp cho:

- Về sinh phụ nữ hàng ngày;
- Trị ngứa do viêm âm đạo
gây ra bởi virus Herpes hoặc
viêm ngoài tử cung;
- Bệnh nhân nam: Bị viêm,
ngứa vùng sinh dục.

Liều lượng và cách dùng:
Chỉ dùng dịch ra khỏi bản
tay, xoa lên chỗ cần vệ sinh,
chờ khô độ 2 - 3 phút, sau
đó rửa lại bằng nước sạch,
ngày dùng 2 - 3 lần.

Chống chỉ định: Tác dụng
không mong muốn:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Biện pháp: Nhiệt độ, độ ẩm
cao, ánh sáng, nên bảo quản
ở dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Mangizeni

Formula: 60 ml / Bottle
Extract from mango fruits
0,5 % of mangiferin- 12 mg,
Tween 80, Camphor, Menthol,
Vitamin E, Thymol, Acid
benzoic, Natri benzoat,
Muckadot EQ 112, Purified
Water income 60ml.

Indications: Gel Solutions
Mangizeni gel is used for
prevention and treatment
of genital infections
* Daily feminine hygiene.

- Treatment of itching,
inflammation of the vagina
caused by herpes virus or
candida infection, uterine
inflammation.

- Male hygiene: itching due to
genital infection.

Directions for use:
Wear a small amount on your
palm, rub and apply to
intimate area, waiting for 2-3
minutes then rinse well. Used
2-3 times daily.

**Contraindications, Side
effects:**
See the package insert.

Storage: Store in a dry and
cool place, below 30°C,
protect from the light.

Specification: In-house.

**KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN,
READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE.**

Mangizeni

Thành phần: Chứa 60 ml
Dịch chiết từ vỏ trái 0,5%
Mangiferin, 12.000 mg, Tween
80, Camphor, Menthol, Vitamin
E, Thymol, Acid benzoic, Natri
benzoat, Muckadot EQ 112,
Nước tinh khiết vừa đủ 60 ml.

Chỉ định: Gel dùng ngoài
Mangizeni dùng gel được
dùng để phòng và điều trị
viêm nhiễm đường sinh dục,
thích hợp cho:

- Về sinh phụ nữ hàng ngày;
- Trị ngứa do viêm âm đạo
gây ra bởi virus Herpes hoặc
viêm ngoài tử cung;
- Bệnh nhân nam: Bị viêm,
ngứa vùng sinh dục.

Liều lượng và cách dùng:
Chỉ dùng dịch ra khỏi bản
tay, xoa lên chỗ cần vệ sinh,
chờ khô độ 2 - 3 phút, sau
đó rửa lại bằng nước sạch,
ngày dùng 2 - 3 lần.

Chống chỉ định: Tác dụng
không mong muốn:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Biện pháp: Nhiệt độ, độ ẩm
cao, ánh sáng, nên bảo quản
ở dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG
Phòng 4A, Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà 1, Ngõ 165 Đường Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

SDK / Reg No.:
Số lot SX:
Batch No.
Ngày SX:
Mfg date
Hạn dùng:
Exp date

Mã vạch

Mangizeni

Thành phần: Chứa 60 ml
Dịch chiết từ vỏ trái 0,5%
Mangiferin, 12.000 mg, Tween
80, Camphor, Menthol, Vitamin
E, Thymol, Acid benzoic, Natri
benzoat, Muckadot EQ 112,
Nước tinh khiết vừa đủ 60 ml.

Chỉ định: Gel dùng ngoài
Mangizeni dùng gel được
dùng để phòng và điều trị
viêm nhiễm đường sinh dục,
thích hợp cho:

- Về sinh phụ nữ hàng ngày;
- Trị ngứa do viêm âm đạo
gây ra bởi virus Herpes hoặc
viêm ngoài tử cung;
- Bệnh nhân nam: Bị viêm,
ngứa vùng sinh dục.

Liều lượng và cách dùng:
Chỉ dùng dịch ra khỏi bản
tay, xoa lên chỗ cần vệ sinh,
chờ khô độ 2 - 3 phút, sau
đó rửa lại bằng nước sạch,
ngày dùng 2 - 3 lần.

Chống chỉ định: Tác dụng
không mong muốn:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Biện pháp: Nhiệt độ, độ ẩm
cao, ánh sáng, nên bảo quản
ở dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Mangizeni

Thành phần: Chứa 60 ml
Dịch chiết từ vỏ trái 0,5%
Mangiferin, 12.000 mg, Tween
80, Camphor, Menthol, Vitamin
E, Thymol, Acid benzoic, Natri
benzoat, Muckadot EQ 112,
Nước tinh khiết vừa đủ 60 ml.

Chỉ định: Gel dùng ngoài
Mangizeni dùng gel được
dùng để phòng và điều trị
viêm nhiễm đường sinh dục,
thích hợp cho:

- Về sinh phụ nữ hàng ngày;
- Trị ngứa do viêm âm đạo
gây ra bởi virus Herpes hoặc
viêm ngoài tử cung;
- Bệnh nhân nam: Bị viêm,
ngứa vùng sinh dục.

Liều lượng và cách dùng:
Chỉ dùng dịch ra khỏi bản
tay, xoa lên chỗ cần vệ sinh,
chờ khô độ 2 - 3 phút, sau
đó rửa lại bằng nước sạch,
ngày dùng 2 - 3 lần.

Chống chỉ định: Tác dụng
không mong muốn:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Biện pháp: Nhiệt độ, độ ẩm
cao, ánh sáng, nên bảo quản
ở dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Tài liệu lưu hành nội bộ

Gel dùng ngoài **Mangizeni**

Gel dùng ngoài Mangizeni với hoạt chất chiết xuất từ lá Xoài (*Extractum Folium Mangifera*) có tác dụng sát khuẩn, kháng virus Herpes

THÀNH PHẦN: Cho hộp 1 chai 60ml

Hoạt chất
Dịch chiết lá xoài 0,5% Mangiferin (*Extractum Folium Mangifera*) 12,000 ml
Tinh dầu long não
(*Oleum Cinnamomi camphorae*) 0.23g
Tinh dầu bạc hà (*Oleum Menthae arvensis*) 0.13g
Tá dược:
Tween 80 – 1,20g
Acid lactic – 0.30g
Natri Benzoat – 0.36g
Mackadet EQ 112 – 6,00g
Natri Lauryl sulfat- 2,40g
Hydroxy Ethyl Cellulose – 0,30g
Glycerin – 2,40g
Nước tinh khiết vừa đủ - 60ml

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gel trong, có màu từ vàng nhạt đến lục nhạt, có mùi thơm đặc trưng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai 60ml, Hộp 1 chai 120ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: Gel dùng ngoài Mangizeni được dùng để phòng và điều trị viêm nhiễm đường sinh dục, thích hợp cho:

- Vệ sinh phụ nữ hàng ngày;
- + Trị ngứa do viêm âm đạo gây ra bởi virus Herpes hoặc viêm ngoài tử cung.
- + Sản phụ trước và sau khi sinh
- **Bệnh nhân nam:** Bị viêm, ngứa vùng sinh dục

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Chế gel ra lòng bàn tay, xoa lên chỗ cần vệ sinh, chà nhẹ để 2-3 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch, ngày dùng 2-3 lần.

Khi nào không nên dùng thuốc này: Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc
Tác dụng không mong muốn: Có thể gây nóng, rát nếu niêm mạc bị trầy.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này. Chưa có báo cáo ghi nhận về điều này.

Cần làm gì khi một lần quên thuốc: Đây là thuốc dùng ngoài nên khi quên thì dùng lại

BẢO QUẢN: Đậy kín để nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: Thuốc dùng ngoài chưa thấy báo cáo về dùng quá liều.

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều: Chưa có báo cáo

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

- Để xa tầm tay trẻ em
- Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng hoặc đã biến màu
- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ:

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

HẠN DÙNG: 24 tháng

SẢN XUẤT TẠI:

Công ty Cổ phần dược Nature Việt Nam
Số 19, Đường 18, Khu phố 3, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

ĐĂNG KÍ VÀ PHÂN PHỐI BỞI:

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng
P4A, tầng 4, tòa nhà Sông Đà 1, Ngõ 165 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP, Hà Nội



**GOLDEN DRAGON
PHARMACEUTICAL CO**

