

Thuốc bột pha hỗn dịch uống chai 50ml



# MEBIFACLOR

Cefaclor monohydrate  
Equivalent to Cefaclor 125mg/ 5ml

Powder for oral suspension  
Box of 1 bottle

- ✓ Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp: viêm phổi, viêm phế quản
- ✓ Viêm xoang, viêm tai giữa
- ✓ Viêm da và mô mềm
- ✓ Nhiễm trùng đường tiết niệu cấp và mạn tính



Thuốc bột pha hỗn dịch uống chai 50ml  
(Mùi Dâu)

# MEBIFACLOR

### THÀNH PHẦN:

Mỗi 5ml hỗn dịch sau khi pha chứa:  
Cefaclor monohydrat tương đương cefaclor .....125mg  
Tá dược vừa đủ ..... 5ml  
Thành phần tá dược gồm: Carboxyl-methyl cellulose sodium, Silicon dioxid colloidat, Strawberry PWD FLV, bột talc, màu đỏ erythrosine lake, Natribenzoat, Acid benzoic, Sucrose.

### CHỈ ĐỊNH:

- Nhiễm trùng đường hô hấp: viêm phổi, viêm phế quản, đợt cấp của viêm phế quản mạn tính, viêm họng, viêm amidan, viêm xoang.
- Viêm tai giữa.
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm.
- Nhiễm trùng đường tiết niệu cấp và mạn tính.

### CÁCH DÙNG:

- Dùng đường uống.
- Lắc cho bột tơi hoàn toàn, sau đó cho nước vào đến vạch trên thân chai và lắc kỹ.
- Thêm nước nếu cần thiết cho đến vạch.
- Hỗn dịch sau khi pha đậy kín bảo quản trong tủ lạnh (2-8°C) dùng trong vòng 14 ngày.

### LIỀU DÙNG:

#### Trẻ em:

- 20mg/kg cân nặng/ ngày, mỗi liều cách nhau 8 giờ hoặc 12 giờ ( viêm họng, viêm tai) có thể tăng lên 40mg/kg cân nặng/ ngày.

Hỗn dịch sau khi pha với nước	Hàm lượng cefaclor 125mg/5ml
<1 tuổi (9kg)	2,5ml x 3 lần/ ngày
1-5 tuổi (9-18kg)	5,0ml x 3 lần/ ngày
>5 tuổi	10ml x 3 lần/ ngày

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc, với nhóm cephalosporin.

### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Nhóm cephalosporin thế hệ 2.
- Thuốc được hấp thu tốt lúc đói. Khoảng 60-85% thuốc được thải qua nước tiểu dưới dạng không đổi trong vòng 8 giờ.

### THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân suy thận.

**QUY CÁCH:** Hộp 1 lọ x 50ml

**BẢO QUẢN:** Nhiệt độ phòng (<30°C).

**NHÀ SẢN XUẤT:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ  
Địa chỉ: Lô III- Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM.