

MECONER 500 µg

Thành phần:

Mecobalamin.....500 µg

Tá dược vđ1 viên

(Tá dược: Lactose khan, Microcrystalline cellulose,
Mannitol, Colloidal silicone dioxide)

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Dược lực học: Trong cơ thể người, các cobalamin này (cyanocobalamin và hydroxocobalamin) tạo thành các coenzym hoạt động là mecobalamin và 5 -deoxyadenosylcobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Mecobalamin rất cần để tạo methionin và dẫn chất là Sadenosylmethionin từ homocystein.

Dược động học: Các nghiên cứu dược lý trên chuột cho thấy khi cho chuột uống Mecobalamin (^{57}Co), tính phóng xạ sau 72 giờ đã được tìm thấy theo thứ tự nồng độ giảm dần ở thận, tuyến thượng thận, tụy, gan và dạ dày. Hoạt tính phóng xạ tương đối thấp ở cơ, tinh hoàn, não và tế bào thần kinh.

Chỉ định: Thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12.

Liều lượng và cách dùng: Dùng đường uống.

- Người lớn 3 viên (1.500 µg Mecobalamin) mỗi ngày, chia làm ba lần.
- Liều có thể tăng giảm tùy theo độ tuổi và mức độ trầm trọng của triệu chứng.

Chống chỉ định: Có tiền sử dị ứng với các cobalamin (vitamin B12 và các chất liên quan); U ác tính: Do vitamin B12 làm tăng trưởng các mô có tốc độ sinh trưởng cao, nên có nguy cơ làm u tiến triển; Người bệnh cơ địa dị ứng (hen, eczema).

Thận trọng:

- Không nên dùng thuốc quá 1 tháng nếu việc sử dụng MECONER không đạt được kết quả tốt.
- Khuyến tránh dùng quá liều MECONER ở bệnh nhân tiếp xúc với thủy ngân và chế phẩm của nó.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Các thuốc Aminoglycoside, acid aminosalicylic, thuốc chống co giật, biguanide, chloramphenicol, cholestyramine, cimetidine, colchicine, muối kali và methyldopa có thể giảm sự hấp thu Vitamin B₁₂ từ đường tiêu hóa. Nồng độ thuốc trong huyết thanh có thể giảm khi dùng đồng thời với thuốc ngừa thai.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Số liệu nghiên cứu trên người còn hạn chế, do đó thận trọng khi ghi toa cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy: Chưa thấy có báo cáo về ảnh hưởng nguy hại của mecobalamin đối với khả năng tập trung khi lái xe hoặc vận hành thiết bị, máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Tiêu hóa: thỉnh thoảng chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy có thể xảy ra.
- Da: phát ban có thể xảy ra.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Sử dụng quá liều: Cho đến nay chưa thấy có báo cáo về hiện tượng quá liều đối với mecobalamin.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nhiệt độ 20 - 25°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung,

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tel: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846