


\* Nhãn trên tuýp 10 g:



SLSX  
HD

Xưởng in phun lên tuýp:



Đường kính

98 mm  
Chiều dài chưa cuộn

\* Nhãn trên hộp 1 tuýp × 10 g:



\* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:**



**CÔNG THỨC:**

Erythromycin ..... 400 mg  
Tretinoin ..... 2,5 mg  
Tá dược vừa đủ ..... 10 g  
(BHT, HPC-H, propylen glycol, hương dove, ethanol 96%).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Gel bôi ngoài da.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 tuýp x 10 g.

**DƯỢC LỰC HỌC:** Erythromycin là kháng sinh nhóm macrolid có tác dụng kìm khuẩn trên các tác nhân gây bệnh liên quan đến sự phát triển mụn trứng cá. Erythromycin dạng bôi có tác dụng làm giảm nồng độ lipid trên bề mặt da và có tác dụng kháng viêm trực tiếp.

Tretinoin có tác dụng tại chỗ như tác nhân làm bong tróc lớp sừng do làm tăng đáng kể chu kỳ thay da ở biểu mô bị sừng hóa khi bị mụn.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Hấp thu qua da của erythromycin là không đáng kể sau khi bôi trong một vài tuần trên vùng da rộng. Sau khi bôi, 6% liều bôi tretinoin có trong nước tiểu trong 50 - 60 giờ. Tỷ lệ bài tiết ở thận so với bài tiết ở mật là khoảng 1: 3, do đó tổng khả năng hấp thu tối đa là 24%.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các dạng mụn, kể cả dạng mụn không viêm như mụn trứng cá và mụn dạng viêm như mụn sẩn và mụn mủ, đặc biệt ở những người có làn da rất nhờn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Tiền sử gia đình bị ung thư biểu mô da.

Các trường hợp: eczema cấp tính, trứng cá đỏ và các tình trạng viêm da cấp tính, đặc biệt là xung quanh miệng.

Nguy cơ gây cháy nắng khi sử dụng đồng thời với các sản phẩm bôi da khác, đặc biệt là đối với những sản phẩm chứa tác nhân làm bong tróc lớp sừng.

**THẬN TRỌNG:** Nhạy cảm ánh sáng có thể xảy ra trong khi điều trị, nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia UV. Bệnh nhân bị cháy nắng không nên sử dụng sản phẩm. Gió và mưa có thể gây rát da đối với các bệnh nhân đang điều trị.

Nên tránh để tích lũy sản phẩm trong các nếp gấp da hoặc trong các góc của mũi.

Tránh tiếp xúc với mắt hoặc mí mắt. Nếu trường hợp này xảy ra, cần rửa sạch bằng nước.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Nên tránh sử dụng sản phẩm cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc những phụ nữ có khả năng có thai và phụ nữ đang cho con bú.

**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

## MedSkin **CLEAR**

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Kích ứng da có thể được tăng cường bằng tia UV (ánh sáng mặt trời tự nhiên, đèn mặt trời, giường mặt trời), X - quang hoặc do tắm biển trong nước có chứa clo hoặc muối.

Không nên dùng đồng thời với các thuốc khác trên da đặc biệt là đối với những sản phẩm chứa tác nhân làm bong tróc lớp sừng.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Hiếm gặp: kích ứng da dạng ban đỏ, rát, khô hay bong tróc da. Trong những trường hợp rất hiếm các triệu chứng trên cũng có thể là một biểu hiện của phản ứng quá mẫn (dị ứng ở bệnh nhân eczema). Khi bắt đầu điều trị, có thể có sự gia tăng của mụn và các triệu chứng viêm; đây là một dấu hiệu cho thấy thuốc bắt đầu có tác dụng và thường là tạm thời. Nếu tình trạng trên xảy ra, không nên ngừng điều trị nhưng tần số sử dụng nên giảm.

Hiếm gặp tình trạng giảm hoặc tăng sắc tố tạm thời ở những người được điều trị bằng tretinoin. Mất sắc tố cũng được báo cáo (ngoại trừ người da trắng).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Medskin Clear chỉ được sử dụng ngoài da. Quá liều sẽ không xảy ra vì lượng erythromycin và tretinoin hấp thu quá nhỏ để gây nhiễm độc toàn thân. Nếu vô tình uống sản phẩm một lượng lớn, rửa dạ dày nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Thoa trên vùng da bị mụn 1 hoặc 2 lần/ngày.

Nên điều trị tiếp tục 9 - 12 tuần tùy theo tình trạng da. Cần chú ý rằng việc cải thiện triệu chứng có thể không được quan sát sau vài tuần sử dụng. Tuần thủ điều trị đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của việc điều trị.

Liều lượng là như nhau cho tất cả các lứa tuổi.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.**

**Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.**

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Điều kiện bảo quản:**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng  
☎ 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn  
[www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)



TUQ CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Thị Thu Thủy*

