



Tên thương mại: STADA 500 mg
Số phân tích: 500 mg
Số đăng ký: 1
Họ và tên: Trung Tam Thuoc.com

THÀNH PHẦN:
Mefenamic acid 500 mg

ĐẶC ĐIỂM:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC:
Mefenamic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau, giảm sưng và hạ sốt.

PHÓ QUẢN LÝ
Nguyễn Thị Hằng

Chỉ định:
Mefenamic acid được chỉ định để điều trị các cơn đau cấp tính, giảm đau, hạ sốt và giảm viêm.

Liều lượng:
Liều lượng thông thường là 500 mg 3-4 lần mỗi ngày, sau bữa ăn, không quá 2000 mg trong 24 giờ.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

Chống chỉ định:
Không dùng nếu có tiền sử loét dạ dày tá tràng, bệnh thận nặng, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, hoặc đang mang thai.

STADA
CÔNG TY TNHH LIỆ DƯỢC VIỆT NAM
Số 1 Nguyễn Văn Linh, Quận Tân Phú, TP. HCM
Số 1 Nguyễn Văn Linh, Quận Tân Phú, TP. HCM

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Phan Hằng