

**MEGYNA**

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**  
10 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ - Q.3  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**CÔNG THỨC :**

Metronidazol..... 0,200g

Cloramphenicol..... 0,080g

Dexamethason acetat..... 0,5mg

Nystatin..... 100.000 IU

Tá dược v.d..... 1 viên

**BẢO QUẢN :**

Dưới 25°C, tránh ánh sáng

SDK :

Tiêu chuẩn : TCCS

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

**CHỈ ĐỊNH :**

Trị các chứng viêm nhiễm âm đạo do

nhuộm khuẩn Trichomonas, Candida

albicans.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

- Dùng với dẫn chất imidazol và các

thành phần khác của thuốc.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

**CÁCH DÙNG :**

Đặt vào âm đạo 1 viên, buổi tối

trước khi ngủ, liên tiếp từ 10 -

15 ngày.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

**MEGYNA**

**MEGYNA**

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo

**THUỐC BÁN THEO ĐƠN**

**MEGYNA**

Hộp 10 viên nén đặt âm đạo



Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO số 930 C2,  
đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM

**MEGYNA**



THUỐC BÁN THEO ĐƠN

**MEGYNA<sup>®</sup>**

Viên nén đặt âm đạo

**CÔNG THỨC :** Cho 1 viên

- Metronidazol ..... 200 mg
- Cloramphenicol ..... 80 mg
- Dexamethason acetat ..... 0,5 mg
- Nystatin ..... 100.000 IU
- Tá dược: Lactose monohydrat, Erapac, Eragel, Povidon K90, Kali sorbat, Bột talc, Colloidal silica khan, Natri laurylsulfat, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

**CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:**

**DƯỢC LỰC HỌC:**

- Metronidazol là thuốc kháng khuẩn thuộc họ nitro-5-imidazole có phổ kháng khuẩn rộng trên động vật nguyên sinh như Amip, Giardia và trên vi khuẩn kỵ khí. Sự hấp thu của Metronidazol khi dùng đường âm đạo chỉ bằng nửa khi uống nếu dùng liều bằng nhau.
- Dexamethason là thuốc chống viêm, chống dị ứng.
- Nystatin là kháng sinh kháng nấm.
- Cloramphenicol là kháng sinh có tác dụng kim khuẩn nhưng có tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ cao hoặc đối với các vi khuẩn nhạy cảm cao.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Tác động điều trị của thuốc chủ yếu do tác dụng tại chỗ.

**CHỈ ĐỊNH :**

Trị các chứng viêm nhiễm âm đạo, viêm do Trichomonas, do nấm Candida albicans.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

- Dị ứng với dẫn chất imidazol và các thành phần khác của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :**

Khi đặt có thể gặp các phản ứng kích ứng tại chỗ.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### **TƯƠNG TÁC THUỐC :**

- Dùng đồng thời MEGYNA với phenobarbital làm tăng chuyển hóa metronidazol nên metronidazol thải trừ nhanh hơn, đồng thời cũng làm tăng thanh thải dexamethason, vì vậy sẽ làm giảm tác dụng điều trị.
- Hiệu lực của các dẫn chất cumarin chống đông máu có thể tăng khi dùng đồng thời với metronidazol và dexamethason, vì vậy tránh dùng cùng lúc.
- Mất tác dụng kháng Candida albicans nếu dùng đồng thời với riboflavin phosphat.

### **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Không dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

### **LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Không ảnh hưởng.

### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Chưa có tài liệu nào công bố.

### **CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG :**

Nhúng viên thuốc vào nước đun sôi để nguội khoảng 20 giây. Đặt sâu vào âm đạo, 1 viên/buổi tối trước khi đi ngủ. Dùng liên tiếp 10 - 15 ngày.

### **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :**

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén. Chai 10 viên nén.

### **BẢO QUẢN :**

Dưới 25°C, tránh ánh sáng.

### **HẠN DÙNG :**

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên nén đặt âm đạo MEGYNA đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.
- Không dùng quá liều chỉ định.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com