

Mẫu nhãn hộp 1 tuýp : **Mibery gel 4%**

Kích thước : 120 x 30 x 25 mm

Màu sắc : như mẫu

<https://trungtamthuoc.com/>

SEI 146

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/.../8/2014

25 mm

120 mm

**Thành phần**

Erythromycin ..... 4.0%  
Tá dược ..... vd 1 tuýp

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C.  
Tiêu chuẩn cơ sở.  
SDK-Reg. No.:

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng, Cách dùng,  
Tương tác, Thận trọng, Tác dụng phụ: Xin đọc  
hướng dẫn sử dụng.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!**

**Rx** Thuốc bán theo đơn

Thuốc dùng ngoài

**Mibery gel 4%**



Erythromycin 4%  
Hộp 1 tuýp 15g gel

Sản xuất theo nhượng quyền của mibe GmbH ARZNEIMITTEL - CHLB ĐỨC

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

**Composition**

Erythromycin ..... 4.0%  
Excipients ..... q.s. 1 tube

Manufacturer's specification.  
Store in a dry place, below 30°C.

Indications, Dosage and Administration,  
Contraindications, Interactions, Side effects and  
other precautions: Read carefully the enclosed leaflet.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE!**

**Rx** Prescription only

For external use only

**Mibery gel 4%**



Erythromycin 4%  
Box of 1 tube of 15g

Manufactured under licence from mibe GmbH ARZNEIMITTEL - GERMANY

HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD. Lot B, Road No 2, Dong An Industrial Park, Binh Duong Province, Vietnam

Số SX - Batch No.:  
NSX - Mfg Date:  
HD - Exp. Date:



Mẫu nhãn tuýp : **Mibery gel 4%**

Kích thước : 85 x 60 mm

Màu sắc : như mẫu

<https://trungtamthuoc.com/>

**Rx** Thuốc bán theo đơn      Thuốc dùng ngoài      

**Mibery gel 4%**

Erythromycin 4%  
15g Gel

**Thành phần**  
Erythromycin ..... 4,0%  
Tá dược ..... vđ 1 tuýp

**Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng, Cách dùng, Tương tác, Thận trọng, Tác dụng phụ:** Xin đọc hướng dẫn sử dụng.

**ĐỂ XÁT TẤM TAY TRẼM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG!**

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C.  
Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất theo nhượng quyền của Mibo GmbH ARZNEIMITTEL - CHLB ĐỨC  
CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM      Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

**Rx** Thuốc bán theo đơn      Thuốc dùng ngoài      

**Mibery gel 4%**

Erythromycin 4%  
15g Gel

Số 10 SX - HD:



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. Trần Đình Hưởng

140 x 200 mm

## Hướng dẫn sử dụng thuốc

## Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

# Mibery gel 4%

Rx Thuốc bán theo đơn

Gel bôi ngoài da

### Thành phần

- **Hoạt chất:** Erythromycin 4%.
- **Tá dược:** butylhydroxytoluen, hydroxypropyl cellulose, ethanol 96%.

### Dược lực học

- Erythromycin là kháng sinh nhóm macrolid, có phổ tác dụng rộng, chủ yếu là kìm khuẩn đối với vi khuẩn Gram dương, Gram âm và các vi khuẩn khác bao gồm *Mycoplasma*, *Spirochetes*, *Chlamydia*, *Rickettsia*.
- Erythromycin gần thuận nghịch với tiểu đơn vị 50S ribosom của vi khuẩn nhạy cảm và ức chế tổng hợp protein. Tác dụng chính của Erythromycin là kìm khuẩn nhưng có thể diệt khuẩn ở nồng độ cao đối với các chủng rất nhạy cảm. Tác dụng của thuốc tăng lên ở pH kiềm nhẹ (khoảng 8,5), đặc biệt với các vi khuẩn Gram âm.
- Gel Erythromycin là thuốc trị mụn trứng cá dạng bôi tại chỗ, có tác dụng ức chế các vi khuẩn gây bệnh về da như *Propionibacterium acnes*, các cấu khuẩn (*Staphylococcus*,...), do đó giúp làm giảm viêm, giảm nốt sần, mụn mủ.
- Thành phần ethanol trong gel giúp hòa tan bã nhờn trên da và hỗ trợ tác dụng diệt khuẩn của Erythromycin.

### Dược động học

- Erythromycin được phóng thích từ gel nền và ngấm vào tuyến bã nhờn nằm dưới lỗ chân lông.
- Sự hấp thu qua da của Erythromycin là không đáng kể.

### Chỉ định

Điều trị mụn trứng cá, đặc biệt các dạng mụn mủ, mụn bọc, sẩn viêm. Có thể kết hợp điều trị với các thuốc trị mụn khác.

### Liều lượng và cách dùng

- **Liều lượng:** thoa 2 lần/ngày lên những khu vực bị mụn. Điều trị trung bình 1 - 3 tháng cho đến khi bệnh thuyên giảm.
- **Cách dùng:** thoa một lớp mỏng Mibery gel 4% lên vùng da bị mụn vào mỗi buổi sáng và buổi tối sau khi đã rửa sạch da.

### Chống chỉ định

Quá mẫn với Erythromycin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

### Thận trọng

- Việc sử dụng các thuốc kháng sinh có thể đi kèm với sự tăng sinh vi khuẩn đề kháng. Nếu xuất hiện tác dụng này, nên ngưng thuốc và áp dụng những biện pháp

thích hợp.

- Mibery gel 4% chỉ dùng ngoài da và nên tránh tiếp xúc với mắt, mũi, miệng, vết thương hở và niêm mạc. Nếu vô ý bị tiếp xúc, rửa kỹ bằng nước. Nếu xuất hiện phản ứng nhạy cảm hay kích ứng trầm trọng nên ngưng thuốc.

### Tác dụng phụ

Phản ứng da: khô da, nhạy cảm, ngứa ngáy, da tróc vảy, nổi ban, da nhờn, cảm giác rát bỏng. Các phản ứng này phục hồi khi ngưng hoặc kéo dài khoảng cách dùng thuốc.

### Tương tác thuốc

- Sử dụng đồng thời với các chế phẩm có chứa cồn, làm mòn da có thể gây kích ứng hoặc làm khô da.
- Không nên dùng đồng thời với các chế phẩm bôi da có chứa clindamycin, do có sự cạnh tranh gắn kết trên tiểu đơn vị ribosom 50S.

### Quá liều và cách xử trí

Nếu dùng quá nhiều thuốc sẽ không thu được kết quả nhanh hơn hoặc tốt hơn mà có thể gây đỏ da, bong da hay khó chịu.

### Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Tính an toàn của Erythromycin bôi ngoài da dùng cho phụ nữ có thai hay cho con bú chưa được xác định. Do đó, chỉ nên dùng thuốc cho đối tượng này nếu thật sự cần thiết.

### Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không có dữ liệu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Trình bày:** Hộp 01 tuýp 15 g gel, Tuýp nhôm.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn cơ sở.

**Hạn dùng:** 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

### Lưu ý

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



Sản xuất theo những quyền của mibe GmbH ARZNEIMITTEL - CHLB ĐỨC

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM  
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Trần Đình Hùng