

Mẫu nhãn hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài: **MIGOMIK**

Kích thước

: 97 x 44 x 20 mm

Màu sắc

: như mẫu

659/102  
<https://trungtamthuoc.com/>

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 09/09/15



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DS. Trần Đình Hương**

Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài: **MIGOMIK**  
Kích thước : 97 x 46 x 44 mm  
Màu sắc : như mẫu

<https://trungtamthuoc.com/>





**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ĐS. Trần Đình Hương**

Mẫu nhãn vỉ 10 viên nén dài: **MIGOMIK**

Kích thước : 92 x 40 mm

Màu sắc : như mẫu

<https://trungtamthuoc.com/>



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. Trần Đình Hương

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

# Migomik

## Thành phần

- ### Dược lực học

- Dược động học**

- ### Chỉ định

- ### Liều lượng và cách dùng

**Liều lượng:**

- ### Chống chỉ định

- ### Tác dụng phụ

- Thân trọng**

- Để thuốc xa tầm tay của trẻ em**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đ. Trần Đình Hương**

140 x 200 mm

### Hướng dẫn sử dụng thuốc

### Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- khác, có thể gây co thắt mạch, kể cả đau thắt ngực nhưng ít gặp hơn nhiều. Tác dụng này thường liên quan đến liều dùng. Tuy nhiên, có một số bệnh nhân có thể nhạy cảm với thuốc. Vì co thắt mạch kéo dài có thể gây hoại tử hoặc chết, nếu có dấu hiệu và triệu chứng của co mạch (đau cơ, mất cảm giác, lạnh đầu chi, xanh nhợt, tím ngón chân, tay), đau thắt ngực hoặc hội chứng bất thường như thiếu máu cục bộ mạc treo ruột phải ngưng thuốc ngay.
- Chỉ nên dùng Dihydroergotamin cho các loại đau nửa đầu do vận mạch; không có tác dụng trong các loại đau đầu khác và thuốc không có tính chất giảm đau.
  - Khi dùng thuốc, bệnh nhân nên báo ngay cho bác sĩ điều trị khi có các dấu hiệu sau đây: mất cảm giác hay đau nhói đầu ngón chân, tay, đau cơ cánh tay, cẳng chân, yếu cơ chi dưới, đau ngực, nhịp tim chậm hoặc nhanh nhất thời, sưng, ngứa.

### Tương tác thuốc

- Với thuốc co mạch: Không được dùng đồng thời Dihydroergotamin với các thuốc co mạch hoặc thuốc cường giao cảm vì sẽ làm tăng huyết áp quá mức.
- Với thuốc chẹn beta: Nấm cựa gà gây co mạch. Thuốc chẹn beta phong bế giao cảm beta 2 nên cũng gây co mạch và làm giảm lưu lượng máu do giảm lưu lượng tim.
- Với nicotin: Nicotin có thể gây co mạch ở một số bệnh nhân làm tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ của nấm cựa gà.
- Với thuốc kháng sinh macrolid (erythromycin, josamycin, ponsinomycin, triacetyloleandomycin): Khi dùng phối hợp, nhiễm độc nấm cựa gà tăng nhanh.
- Với glyceryltrinitrat: Dihydroergotamin chống lại tác dụng giãn mạch của glyceryltrinitrat (nitroglycerin).
- Nấm cựa gà + methysergid: làm tăng nguy cơ co thắt các động mạch chủ yếu ở một số bệnh nhân.

### Quá liều và cách xử trí

- Cho đến nay, chưa có thông báo nào về quá liều cấp với thuốc này. Quá liều có thể gây các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm độc nấm cựa gà: mất cảm giác, đau nhói, đau và xanh tím đầu chi kèm theo mất mạch hoặc mạch đập yếu; khó thở, tăng và/hoặc giảm huyết áp, lú lẫn, mê sảng, co giật và hôn mê; buồn nôn, nôn có mức độ và đau bụng.
- Điều trị gồm có ngừng thuốc, đắp nóng tại vùng bị tổn thương, cho thuốc giãn mạch (natri nitroprussid

hoặc phentolamin) và chăm sóc để phòng ngừa tổn thương mô.

- Nghiện và lệ thuộc thuốc: hiện nay chưa có số liệu chứng tỏ có nghiện và lệ thuộc tâm lý với Dihydroergotamin. Vì tính chất mạn tính của đau đầu vận mạch, cần khuyến bệnh nhân không được dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

### Sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú

- Một lượng nhỏ Dihydroergotamin qua nhau thai, mặc dù không gây độc cho thai nhưng gây co thắt mạch máu tử cung, làm tăng trương lực cơ tử cung, giảm lưu lượng máu tử cung và nhau thai, ngăn cản thai phát triển. Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ mang thai.
- Thuốc nấm cựa gà ức chế prolactin. Dihydroergotamin bài tiết vào sữa mẹ, có thể gây nôn, tiêu chảy, mạch yếu, huyết áp không ổn định cho trẻ nhỏ. Do vậy, không được cho con bú trong khi dùng Dihydroergotamin.

### Tác động của thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc

Bệnh nhân có tiền sử chóng mặt hay rối loạn thần kinh trung ương không nên lái xe, vận hành máy móc.

### Trình bày

Hộp 03 vỉ x 10 viên nén dài. Vĩ bấm AI - PVC đục.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài. Vĩ bấm AI - PVC đục.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

### Lưu ý

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM

Lô B, Đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An,  
Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em



TU QU CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
Nguyễn Thị Khu Thủy