


MẪU NHÃN CHAI NHỰA PHẦN THOA DA

Chai 80g thuốc bột



Ngày 8 tháng 1 năm 2017



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN THOA DA NadyROSA

Phần thoa da

NadyRosa

Thuốc bột dùng ngoài

CÔNG THỨC:

	Chai 80g	Chai 50g
Kẽm oxyd	4g	2,5g
Acid boric	0,8g	0,5g
Titan dioxyd	2,4g	1,5g
Tá dược: Magnesi stearat, bột talc, hương Luxy 099	vừa đủ	80g
	50g	50g

CHỈ ĐỊNH:

Làm mát da, trị: Rôm sảy, ngứa, sẩn đỏ da.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với các thành phần trong phần.
- Không thoa lên các tổn thương da (nhiễm khuẩn, trầy xước,...).

THẬN TRỌNG:

- Không để phần dính vào mắt, mũi, miệng trẻ em.
- Thận trọng với da trẻ sơ sinh thiếu tháng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Không nên bôi thuốc vùng quanh vú khi cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không gây ảnh hưởng cho người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Nếu có dị ứng với một trong các thành phần của phần thoa có thể gây ban đỏ, ngứa, kích ứng cần ngừng thoa phần.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

- Kẽm oxyd: Có tính chất làm săn da và sát khuẩn nhẹ, phần xạ tia cực tím, được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ da; điều trị các bệnh da và nhiễm khuẩn da như: Vết da bị kích ứng, điều trị hỗ trợ chàm (eczema), chấy ngứa, hồng ban do bị chiếu nắng, trứng cá, côn trùng chàm đốt, ban do tả lột, vảy da đầu, tăng tiết nhờn, chốc, nấm da, vẩy nến, ngứa.
- Titan dioxyd: Có tác dụng trên da tương tự kẽm oxyd, có tính phần chiếu tia cực tím nên dùng làm chất bôi chống nắng.
- Acid boric: Là thuốc sát khuẩn tại chỗ có tác dụng kìm khuẩn và kìm nấm yếu, dùng làm chất bảo vệ da để giảm đau, giảm khó chịu trong trường hợp da bị nứt nẻ, nổi ban, da khô, những chỗ da bị cọ sát hoặc các kích ứng da khác.

Các đặc tính dược động học:

- Phần thoa da NadyRosa dạng bột mịn thoa lên da tạo lớp mỏng bảo vệ da làm da luôn mát, mịn màng trị ngứa, sẩn đỏ da, rôm sảy.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Thuốc chỉ dùng thoa lên các vùng da nguyên vẹn, hàm lượng acid boric trong phần thấp (1%), nên tác dụng có hại không đáng kể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Cho một ít phần vào lòng bàn tay hay bông phần rồi thoa lên mình trẻ sau khi tắm, các nơi ngứa, mỗ hôi nhiều (nách, háng, kẽ ngón chân).

Trình bày: Chai nhựa chứa 80g
Chai nhựa chứa 50g

Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất: Theo TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẤY THUỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 29 - NADYPHAR
ĐT: (08) 38687355. FAX: 84.8. 38687356
NHÀ MÁY: 950 C4, đường C, KCN Chí Lát, ckm 2, P.Thanh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thành
Ngày 27 tháng 09 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC
CƠ PHÂN GIỚI ĐỐC
DƯỢC PHẨM
2-9
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐS. *Phải Ngọc Hồng*