

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sản phẩm dùng cho mắt

Natamin 5%

Giới thiệu

Natamin 5% là một hỗn dịch vô khuẩn để nhỏ mắt có tác dụng chống nấm do Natamycin có tác dụng liên kết với các sterol ở màng tế bào nấm, làm biến đổi tính thấm và chức năng của màng, nên kali và các thành phần tế bào thiết yếu khác bị cạn kiệt. Sản phẩm **Natamin 5%** có tác dụng tại chỗ trong giác mạc. Nồng độ có tác dụng không vào được dịch nhãn cầu và không gây tác dụng toàn thân, do đó an toàn với người sử dụng.

Thành phần

Natamycin 5%, benzalkonium clorid, natri hydroxid, acid hydrochloric, nước cất vừa đủ.

Quy cách đóng gói

Lọ 5 ml. Hộp 1 lọ.

Công dụng

Natamin 5% được sử dụng trong những trường hợp như viêm bờ mi, viêm kết mạc, viêm giác mạc gây ra bởi những chủng nấm nhạy cảm bao gồm: viêm giác mạc do *Fusarium solani*.

Hướng dẫn sử dụng

Lắc kỹ ống trước khi dùng.

Liều khởi đầu: khuyến nghị trong viêm giác mạc do nấm là nhỏ 1 giọt Natamin 5% vào túi cùng kết mạc, thời gian nhỏ cách nhau 1 hoặc 2 giờ. Sau 3 - 4 ngày giảm liều xuống còn 1 giọt, 6 - 8 lần/ngày. Nên sử dụng liên tục trong 14 - 21 ngày hoặc cho đến khi hết viêm giác mạc do nấm.

Trong nhiều trường hợp, có thể giảm liều lượng dần dần trong khoảng thời gian từ 4 - 7 ngày để đảm bảo rằng vi sinh vật đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Trong trường hợp viêm bờ mi và viêm kết mạc do vi nấm, có thể dùng liều khởi đầu ít hơn 4 - 6 lần/ngày.

Lưu ý

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Chỉ sử dụng cho đường nhỏ mắt.

Cần giữ khoảng cách giữa mắt và đầu nhỏ của sản phẩm. Để đầu nhỏ tiếp xúc với mắt có thể khiến vi nấm xâm nhập và khiến sản phẩm bị biến chất. Không nên chớp mắt hay dụi mắt thường xuyên sau khi nhỏ sản phẩm.

Bảo quản

Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội