

NENI 800

Piracetam 800 mg

CÔNG THỨC:

Piracetam 800 mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên
 (Croscarmellose sodium, magnesi stearat,
 aerosil, sepifilm LP770)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 3 vỉ x 10 viên.**DƯỢC LỰC HỌC:**

Piracetam là dẫn xuất vòng của acid gamma amino - butyric, có tác dụng cải thiện khả năng học tập và trí nhớ do tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholin, noradrenalin, dopamin. Thuốc có thể làm thay đổi sự dẫn truyền thần kinh và góp phần cải thiện môi trường chuyển hóa để các tế bào thần kinh hoạt động tốt.

Trên thực nghiệm, piracetam có tác dụng bảo vệ chống lại những rối loạn chuyển hóa do thiếu máu cục bộ nhờ làm tăng đế kháng của não đối với tình trạng thiếu oxy. Piracetam còn làm tăng sự huy động và sử dụng glucose mà không lệ thuộc vào sự cung cấp oxy, tạo thuận lợi cho glucose chuyển hóa thành pentose và duy trì sự tổng hợp năng lượng ở não.

Ngoài ra, piracetam còn làm giảm khả năng kết tụ tiểu cầu và trong trường hợp hồng cầu bị cứng bất thường thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng biến dạng và khả năng di qua các mao mạch. Thuốc có tác dụng chống giật rung cơ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau khi uống, piracetam được hấp thu nhanh và hoàn toàn. Sinh khả dụng gần 100%. Nồng độ tối đa đạt được trong huyết tương sau 30 phút và từ 2 đến 8 giờ trong dịch não tủy. Sự hấp thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. Piracetam ngấm vào tất cả các mô và có thể qua hàng rào máu não, nhau thai. Thuốc có nồng độ cao ở vỏ não, thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, tiểu não và các nhân vùng đáy. Thời gian bán hủy từ 4 - 5 giờ trong máu và từ 6 - 8 giờ trong dịch não tủy. Thời gian bán hủy lâu hơn ở người suy thận. Piracetam được đào thải qua thận dưới dạng nguyên vẹn.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi.

Cải thiện một số triệu chứng ở người lớn tuổi như: suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, thiếu tinh táo, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ.

Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp. Điều trị nghiện rượu. Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm.

Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.

Hỗ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Suy gan, suy thận nặng. Người mắc bệnh Huntington.**THẬN TRỌNG:** Người bị suy thận, người cao tuổi.**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không nên dùng piracetam cho những đối tượng này.**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Piracetam tương tác với thuốc kích thích thần kinh trung ương, hóc môn tuyến giáp, warfarin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Toàn thân: mệt mỏi. Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, trương bụng. Thần kinh: bồn chồn, dễ bị kích động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ gà.

Ít gặp: Toàn thân: chóng mặt. Thần kinh: run, kích thích tình dục.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao. Không cần thiết phải có những biện pháp đặc biệt khi nhổ dùng quá liều.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Piracetam dùng theo đường uống.

Người lớn: 1 viên x 3 lần/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.****Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.**Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.****Tiêu chuẩn:** TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thành - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thành, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

ĐT: (0293) 3953454 • Fax: (0293) 3953555

Mọi thắc mắc về sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ
0292.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn

02